

Gibaifar® 20 ST

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Υδατοδιαλυτό δισκίο (ST)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Gibberellic acid 20 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 78,50 % β/β



• Προκαλεί σοβαρό
οφθαλμικό
ερεθισμό

UFI: D300-F04D-1006-AXM4

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΟΥΣΙΑ

10 δισκία
(5 γραμμάρια/δισκίο)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

GR02/10-2023

Περιεχόμενο:
10 δισκία (5
γραμμάρια/
δισκίο)
Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ):
8242/ 01.03.2016

Κάτοχος της άδειας: AIFAR SPA
Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Italia
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr



Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά τη φόρτωση ή ανάμιξη του σκευάσματος. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακριμάνικο πουκάμισο».
Πρώτες βοήθειες:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση δυσφορίας ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό και απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες μικρότερες των 40 °C και μακριά από πηγές ανάφλεξης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: Κουτί: Χαρτί: PAP N°21 ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Ταϊνία πολυεστέρα/ αλουμινίου/ πολυαιθυλενίου: PET/AL/PE trans N° 1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ. Χωριστή συλλογή: Ελέγξτε τις τοπικές δημοτικές οδηγίες.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής:



Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επιμβάσεων (ημέρες)
		γραμ./ 100 λίτρα υγρού	γραμ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κλημενίνες	Για αύξηση της καρπόδεσης	5 (1 δισκίο)	7,5 (1,5 δισκία)	150	Δύο (2) εφαρμογές στην πλήρη άνθηση μέχρι το τέλος της ανθοσης (BBCH 65-71).	3 / 7
	Για παράταση του χρόνου συγκομιδής.				Μία (1) εφαρμογή όταν οι καρποί αλλάζουν χρώμα (BBCH 81).	
ΑΜΠΕΛΙ Εμπραπέζιες Άσπερμες ποικιλίες	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	0,25-10 (0,05-2 δισκία)	0,25-3 (0,05-0,6 δισκία)	30-100	Έξι (6) εφαρμογές από την έναρξη της ανθοσης μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 66-77)	6 / 2-3
ΑΜΠΕΛΙ Εμπραπέζιες Ένσπερμες ποικιλίες	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	2-5 (0,4-1 δισκίο)	2-4 (0,4-0,8 δισκία)	80-100	Τέσσερις (4) εφαρμογές από τη διάγκωση των ταξιανθιών μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 55-75).	4 / 7
Αγκινάρα	Πρωίμηση και αύξηση της παραγωγής	5 (1 δισκίο)	4 (0,8 δισκία)	80	Τρεις (3) εφαρμογές από την εμφάνιση μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της κεφαλής (BBCH 40-49)	3 / 7
Αχλαδιά	1. Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής. 2. Για καθυστέρηση της ωρίμανσης.	2,5-10 (0,5-2 δισκία)	5-10 (1-2 δισκία)	100-200	Μέχρι 2 εφαρμογές από την έναρξη της άνθισης και μέχρι την πλήρη άνθηση (BBCH 61-65).	2/7
Τομάτα (Υ+Θ)	Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.	2,5-10 (0,5-2 δισκία)	2-4 (0,4 – 0,8 δισκία)	40-80	Μέχρι 3 εφαρμογές από την έκπτυξη της 9ης ταξιανθίας και μέχρι την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 59-75).	3/7
Φράουλα (Υ+Θ)	Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.	2,5-10 (0,5-2 δισκία)	2-4 (0,4 – 0,8 δισκία)	40-80	Μέχρι 3 εφαρμογές από την έναρξη της άνθισης και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-81)	3/7

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα (δισκία) του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος δράσης: Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων.

Παρατηρήσεις:

1) Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διάγκωση των ταξιανθιών και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδιών) να γίνονται με δόση 2 γραμ./στρ. (0,4 δισκία/στρ.), η τρίτη εφαρμογή (στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 3 γραμ./στρ. (0,6 δισκία/στρ.) και η τέταρτη εφαρμογή (όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 4 γραμ./στρ. (0,8 δισκία/στρ.).

2) Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις συνθήκες ανάπτυξης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Κλημενίνες, Σταφύλια (ένσπερμα και άσπερμα), Αγκινάρες, Αχλαδιά, Τομάτες (Υ+Θ), Φράουλες (Υ+Θ): --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνες, φυτογόνες ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: --

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής Συνδυαστικότητα: --