

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Αποφεύγετε να αναπνεύετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκκενώματα. Να μην έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή». «**Σε περίπτωση επανεισόδου φράστε μακριά παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια**». «Πλύνετε σχολαστικά όλα τα προστατευτικά ρούχα μετά το χειρισμό». **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή. Αν το άτομο είναι αναισθητό, θαπλώστε το στο πλάι σε θέση ανάνηψης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτήν την ετικέτα ή τον περιέκτη. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε απαλά και με άφθονο σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων.)
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε μη στοχευμένα φυτά να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από γειτονική μη καλλιεργούμενη γη.

Συνδυαστικότητα:

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Πορτοκαλιά, μανταρινιά (για την αποφυγή πτώσης του καρπού): 7, Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες: Μη εφαρμόσιμους.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φυλλών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν (προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



UFI: 2T44-2TD2-UE7T-UUQP

HF-Calibra

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

MCPA-thioethyl 2 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 97,94 % (β/β)

Περιεχόμενο: 1 L
Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 8260/ 9-11-2016

Κάτοχος της άδειας:
SIPCAM INAGRA S.A.
c/Profesor Beltrán Bâguena, 5
46009 Valencia, Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διανομής στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400,
Κορίνθι - Αττικής
Τηλ.: 210 5223834,
E-mail: info@sipcam.gr



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

1 L

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Φυτορρυθμιστική ουσία που αυξάνει την φωτοσύνθεση και τον μεταβολισμό αζώτου, φωσφόρου καθώς και την πρόσληψη καλίου με αποτέλεσμα να συντελεί στην αύξηση του μεγέθους των καρπών σε πορτοκαλιές, μανταρινιές και μηλιές, ενώ συγχρόνως στα εσπεριδοειδή και στο ακτινίδιο συμβάλλει και στην πρόληψη της καρπόπτωσης. Επίσης το HF Calibra αυξάνει το μέγεθος των καρπών σε βερικόκο, ροδάκινο, νεκταρίνι, δαμάσκηνο και συντελεί στην πρόωμη ωρίμανση τους.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό.

Φάσμα δράσης: Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος (κ. εκ/στρ) - Τρόπος εφαρμογής - Όγκος (λτ/στρ): Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά) α) Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών: 25-312, 5 (50-125 κ. εκ/100λτ/ψεκ υγρό). **Στην πορτοκαλιά** εφαρμόζεται από την πλήρη πτώση των πετάλων (καρποί με διάμετρο περίπου 10χιλ.) μέχρι την έναρξη της φυσιολογικής πτώσης των καρπών (καρποί 25-30χιλ.). **Στη μανταρινιά** εφαρμόζεται από την πλήρη πτώση των πετάλων μέχρι το μανταρίνι να φθάσει τα 15-20 χιλ. Όγκος ψεκ υγρού: 250 β) Για την πρόληψη της καρπόπτωσης: 150-400 (100-200 κ. εκ/100λτ/ψεκ υγρό). **Στις πρώιμες ποικιλίες, μία εφαρμογή** κατά τη στιγμή μεταβολής του χρώματος του καρπού. **Στις όψιμες ποικιλίες, μία επιπλέον εφαρμογή** ένα μήνα μετά για να παραταθεί η ημερομηνία συγκομιδής. Όγκος ψεκ υγρού: 150-200. **Μηλιά:** Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών: 75-300 (75-150 κ. εκ/100 λτ ψεκ υγρό). Ένα μήνα πριν τη συγκομιδή. Όγκος ψεκ υγρού: 100-200. **Ροδάκινο - Νεκταρίνι:** Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών και την πρωιμότητα της ωρίμανσης: 90-150 (75-125 κ. εκ/100 λτ/ψεκ υγρό). Μετά το αράωμα, κατά την περίοδο σκληρύνσης του πυρήνα (καρποί 25-35χιλ.), Όγκος ψεκ υγρού: 120. **Βερικόκιά, Δαμασκήνι:** Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών και την πρωιμότητα της ωρίμανσης: 120-180 (100-150 κ. εκ/100λτ ψεκ υγρό). Μετά το αράωμα, κατά την περίοδο σκληρύνσης του πυρήνα (καρποί 25-35χιλ.), Όγκος ψεκ υγρού: 120. **Ακτινίδιο*** (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για την πρόληψη της καρπόπτωσης: 150 (112,5-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού). Υγρό λίτρα/στρ.: 75-100. Όταν οι καρποί έχουν αποκτήσει το 10% μέχρι το 30% του τελικού τους μεγέθους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά α) Για την αύξηση μεγέθους των καρπών: 1, β) Για την πρόληψη της καρπόπτωσης: 1-2 (ανά 30 ημέρες). Μηλιά: 1, Ροδάκινο, Νεκταρίνι: 1, Βερικόκιά, Δαμασκήνι: 1, Ακτινίδιο: 1.

Παρατηρήσεις:

- Σε όλες τις ποικιλίες μανταρινιών και πορτοκαλιών συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με χηλικό κάλιο.
- Επιπλέον στις ποικιλίες της μανταρινιάς Satsuma και Κλημεντίνες καθώς και στις πορτοκαλιές, να γίνεται προσθήκη αμινοξέων και μαγνησίου.
- Στα υβρίδια μανταρινιού (Nova, Fortune, Minneola, Ortanique, κ.λπ.), δεν επιτρέπεται η προσθήκη αμινοξέων, το οποίο όμως μπορεί να αντικατασταθεί από πλήρως ισορροπημένο διαφυλικό λίπασμα σε συνδυασμό με μαγνήσιο ως διορθωτή.
- Το HF CALIBRA μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τη δόση χρήσης, να διατηρεί τη βλαστική ανάπτυξη για κάποιο χρονικό διάστημα, γεγονός που βελτιώνει αισθητά την μετατόπιση των σκαρών προς τους καρπούς.
- Θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της άρδευσης ή της βροχής.
- Να μην εφαρμόζεται όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ασταθείς.
- Συνιστάται η χρήση του με έναν μη ιοντικό παράγοντα διαβροχής ή έναν ρυθμιστή του pH, ο οποίος χρησιμοποιεί ταυτόχρονα ως παράγοντας διαβροχής.
- Μην εφαρμόζετε το HF CALIBRA όταν τα δένδρα υποφέρουν από προσβολές ή δεν είναι επαρκώς λιπασμένα ή υποφέρουν από συνθήκες στρες (υγρασία, ξηρασία, ώσεις, τροφονέσιες, κ.λπ.)
- Εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του πολτού.
- Σε περίπτωση βροχής εντός 6 ωρών από την εφαρμογή με ένταση μεγαλύτερη από 10 l/m² συνιστάται η επανάληψη της εφαρμογής σε 4-6 ημέρες.

*«Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο ακτινίδιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. Παρασκευής:

