

UMOSTART[®]
super zn

ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ C.(I).(a).(ii) NP (11-51) με σίδηρο (Fe) και
ψευδάργυρο (Zn)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P102 Μακριά από παιδιά. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χαμηλό χλώριο / Επαγγελματική χρήση / Μικροκοκκώδες/ Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ
Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε το γιατρό για τις πρώτες βοήθειες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμβουλευτείτε το κέντρο δηλητηριάσεων
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις χρήσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ετικέτα. Όποιος χρησιμοποιεί το προϊόν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του σκευάσματος. Η συμμόρφωση με όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ετικέτα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και να αποφεύγονται οι βλάβες στα φυτά, τους ανθρώπους και τα ζώα. Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν πρέπει να πωλείται χύμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι άδειες συσκευασίες δεν πρέπει να διασπείρονται στο περιβάλλον. Η συσκευασία δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό, κλειστό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης 0-40 °C. Οι μερικώς χρησιμοποιημένοι ή κατεστραμμένοι σάκοι πρέπει να κλείνουν καλά. Υγροσκοπικό προϊόν. Ελέγξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Το Umostart Super Zn είναι ένα καινοτόμο λίπασμα NP. Χάρη στην εξειδικευμένη σύνθεση με μικρόκοκκους και την ειδική του όξινη αντίδραση, προσδίδει στα φυτά ταχεία και έντονη εκκίνηση ριζικής ανάπτυξης και επακόλουθα βλαστικής ανάπτυξης. Συστήνεται το λίπασμα να εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της σποράς ή της μεταφύτευσης. Εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητά του σε P₂O₅, μπορεί να είναι η μόνη πηγή φωσφόρου για πολλές καλλιέργειες, απλοποιώντας την εφαρμογή των λιπασμάτων, αφού μειώνεται ο συνολικός όγκος εφαρμογής σε σχέση με κοινά λιπάσματα. Το Umostart Super Zn είναι εμπλουτισμένο με ψευδάργυρο, ένα θρεπτικό συστατικό που παίζει πρωταρχικό ρόλο, μαζί με τον φώσφορο, για την αρχική ανάπτυξη των καλλιεργειών σε λιγότερο γόνιμα, κρύα και ασβεστολιχικά εδάφη. Το Umostart Super Zn εφαρμόζεται στο αυλάκι της σποράς, κατά τη φύτευση ή τη μεταφύτευση, κατά την εφαρμογή των συνηθισμένων εντομοκτόνων εδάφους με ειδικό μικρο-κοκκοδιανομέα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μίγμα με μικρο-κοκκώδη εντομοκτόνα του ίδιου ειδικού βάρους.

Φυσική κατάσταση:
Μικρόκοκκοι Ø 0,7 mm - Ειδικό βάρος: 900 g/l - pH 5 ± 0,5

UMOSTART[®]
super zn



ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ C.(I).(a).(ii) NP (11-51) με σίδηρο (Fe) και ψευδάργυρο (Zn)
Δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά κατά μάζα Ολικό άζωτο (N) 11% Άζωτο σε αμμωνιακή μορφή 11% Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) 51% Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) 48% Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο ... 51% Ολικό οξείδιο του σιδήρου (Fe) 1,5% Οξείδιο του ψευδαργύρου (Zn), ολικό 1% Κόκκοι: Το 95% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1,5 mm Συστατικά Δισόξινο φωσφορικό αμμώνιο (1) (CAS 7722-76-1) Θειικό αμμώνιο (1) (CAS 7783-20-2) Όξινο φωσφορικό διαμμώνιο (1) (CAS 7783-28-0) ⁽¹⁾ ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα με βάση πρώτες ύλες
Καθαρό βάρος 10Kg
Παρασκευαστής: Sipcarn Inagra, S.A. CIF A46042354 Prof. Beltran Baguena, 5. 46009 VALENCIA SPAIN TEL. + 34 963 483 500 / FAX: + 34 963 482 721 Διανομέας: SIPCARN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400 Κορωπί, τηλ 210-522 3834

ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩΔΕΣ

10 Kg



UMOSTART[®]
super zn

ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ C.(I).(a).(ii) NP (11-51) με σίδηρο (Fe) και
ψευδάργυρο (Zn)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι δόσεις του λιπάσματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το δυναμικό της καλλιέργειας, και τις αγρονομικές συνθήκες.

Καλλιέργειες	Δόση (kg/στρ.)	Χρόνος εφαρμογής
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΟΡΓΟΣ, ΡΥΖΙ, ΣΟΓΙΑ, ΗΛΙΑΝΘΟ	2-4	Τοπικά στο αυλάκι σποράς κατά την σπορά
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ	2-4	Τοπικά στο αυλάκι σποράς κατά την σπορά
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ,ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ	3-6	Τοπικά στο αυλάκι σποράς κατά την σπορά
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	3-6	Τοπικά κατά μήκος στο αυλάκι σποράς ή μεταφύτευσης
ΚΑΠΝΟΣ	3-6	Τοπικά κατά μήκος στο αυλάκι σποράς ή μεταφύτευσης
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)	4-8	Πριν τη μεταφύτευση ή εφαρμογή κοντά στα φυτά κατά τη μεταφύτευση χωρίς να έρχονται οι κόκκοι σε επαφή με τις ρίζες
ΑΜΠΕΛΙ	5-15 γρ/πρέμνο	Στην εγκατάσταση κοντά σε κάθε πρέμνο χωρίς να έρχονται οι κόκκοι σε επαφή με τις ρίζες
ΕΛΙΑ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ	20–50 γρ/φυτό	Στην εγκατάσταση κοντά σε κάθε φυτό χωρίς να έρχονται οι κόκκοι σε επαφή με τις ρίζες
ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ	30 g/m ² 350 g/m ²	Ανάμιξη με το φυτόχωμα ή ανάμιξη σε ειδικού τύπου μίξερ λίγο πριν την χρήση

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις δόσεις εφαρμογής.

