


BlackRock®



Ευρωπαϊκή
πατέντα
SIPCAM

**ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
ΦΥΤΩΝ EC**

**ΟΞΙΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SC**



*Διεχειρεί την ανάπτυξη
βλαστού & ρίζας*


SIPCAM
HELLAS



Το **BlackRock®** ανήκει στην κατηγορία βιοδιεγερτών EC και είναι όξινο μείγμα επιλεγμένων φυτικών αμινοξέων και εκχυλίσματος Λεοναρδίτη σε μορφή SC.

Το **BlackRock®** ως καινοτόμος ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ EC του ομίλου SIPCAM-ΟΧΟΝ εναρμονίζεται με τη νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία 2019/1009. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζει:

- **Εγγυημένη σύνθεση** που προστατεύεται από ευρωπαϊκή πατέντα
- Χρήση πιστοποιημένων **πρώτων υλών**
- **Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες αγρού***

* Η αποτελεσματικότητα στον αγρό αξιολογείται από πειραματικά ανεξάρτητων φορέων προκειμένου να δοθεί έγκριση ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΦΥΤΩΝ EC





ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

- Μοναδική επεξεργασία και μορφή SC
- Όξινο pH
- Φυσικό προϊόν
- Περιέχει χουμικά, φουλβικά οξέα από Λεοναρδίτη σε συνδυασμό με φυτικά αμινοξέα
- Αποτελεσματικό για εφαρμογή στο έδαφος & σε διαφυλλικές εφαρμογές



ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

- Άριστη συνδυαστικότητα και διαλυτότητα
- Εγγυημένη αποτελεσματικότητα ακόμα και στην ελάχιστη δοσολογία
- Ανάπτυξη βλαστικού μέρους φυτών
- Ανάπτυξη ριζικού συστήματος
- Αύξηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας*
- Αύξηση της απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων*

* Σύμφωνα με Πανεπιστημιακές μελέτες και ανεξάρτητες πειραματικές αξιολογήσεις από ερευνητικά κέντρα





Καλλιέργειες	Δοσολογία εφαρμογής (κ.εκ./στρ.)	Μέθοδος εφαρμογής	Στάδιο εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών	Ισχυρισμοί
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ					
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας	100	Κατάκλιση ή καταιονισμός	Στο έδαφος πριν, κατά ή μετά τη σπορά (BBCH 0).	1	Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών: αύξηση νωπού βάρους (βιομάζας) ρίζας και υπέργειου μέρους (γρ./φυτό)
Λαχανοκομικά, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά	300-500	Κατάκλιση ή στάγδην άρδευση γραμμικά	Κάθε 15 ημέρες, ξεκινώντας 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Καρποφόρα λαχανοκομικά και μη κεφαλωτά: Από την ανάπτυξη φύλλων/βλαστών (BBCH12) έως τη βλαστική ανάπτυξη (έως το BBCH 33) και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (έως το BBCH 65). Κεφαλωτά λαχανοκομικά: Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 12 έως BBCH 49).	2-3	
Δενδρώδη πολυετή	200-400		Κάθε 15 ημέρες, ξεκινώντας από την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης. Από την έναρξη ανάπτυξης φύλλων έως τη βλαστική ανάπτυξη (BBCH10- BBCH 31).	2-3	
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ					
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας	100	Διαφυλλικός ψεκασμός	Κατά τη βλαστική ανάπτυξη. Από την ανάπτυξη φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 12-29).	1	Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών: αύξηση νωπού βάρους (βιομάζας) ρίζας και υπέργειου μέρους (γρ./φυτό)
Λαχανοκομικά, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά	100-200		Κάθε 15 ημέρες, ξεκινώντας 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Καρποφόρα λαχανοκομικά (μη κεφαλωτά): Από την ανάπτυξη φύλλων/βλαστών (BBCH12) έως τη βλαστική ανάπτυξη (έως το BBCH 33) και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (έως το BBCH 65). Κεφαλωτά λαχανοκομικά: Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 12 έως BBCH 49).	2-3	
Δενδρώδη πολυετή	100-200		Κάθε 15 ημέρες ξεκινώντας από την έναρξη της έκπτυξης. Από την έναρξη ανάπτυξης φύλλων έως τη βλαστική ανάπτυξη (BBCH10- BBCH 31).	2-3	

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά: