

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ					
Καλλιέργειες	Δοσολογία εφαρμογής (κ.εκ./στρ.)	Μέθοδος εφαρμογής	Στάδιο εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών	Ισχυρισμοί
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας	100-400	Κατάκλιση ή κατασπονώση	Στο έδαφος πριν, κατά ή μετά τη σπορά (BBCH 0)	1	Βελτίωση ποιτικών χαρακτηριστικών: αύξηση νωπού βάρους (βιομάζας) ρίζας (γρ./φυτό)
Λαχανοκομικά, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά	300-500	Κατάκλιση ή στάγδην αρδευση γραμμικά	Κάθε 15 ημέρες, ξεκινώντας 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Καρποφόρα λαχανοκομικά και μη κεφαλωτά: Από την ανάπτυξη φύλλων/βλαστών (BBCH12) έως τη βλαστική ανάπτυξη (έως το BBCH 33) και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (έως το BBCH 65) Κεφαλωτά λαχανοκομικά: Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 12 έως BBCH 49)	2-3	
Δενδρόβη πολυετή	200-400		Κάθε 15 ημέρες, ξεκινώντας από την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης. Από την έναρξη ανάπτυξης φύλλων έως τη βλαστική ανάπτυξη (BBCH10-BBCH 31)	2-3	

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας	100	Διαφυλλικός ψεκασμός	Κατά τη βλαστική ανάπτυξη. Από την ανάπτυξη φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 12-29)	1	Βελτίωση ποιτικών χαρακτηριστικών: αύξηση νωπού βάρους (βιομάζας) ρίζας και υπέργειου μέρους (γρ./φυτό)
Λαχανοκομικά, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά	100-200		Κάθε 15 ημέρες, ξεκινώντας 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Καρποφόρα λαχανοκομικά (μη κεφαλωτά): Από την ανάπτυξη φύλλων/βλαστών (BBCH12) έως τη βλαστική ανάπτυξη (έως το BBCH 33) και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (έως το BBCH 65). Κεφαλωτά λαχανοκομικά: Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 12 έως BBCH 49)	2-3	
Δενδρόβη πολυετή	100-200		Κάθε 15 ημέρες ξεκινώντας από την έναρξη της έκπτυξης. Από την έναρξη ανάπτυξης φύλλων έως τη βλαστική ανάπτυξη (BBCH10-BBCH 31)	2-3	

BlackRock®




ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΚΛΠ) 6B
Μη μικροβιακός βιοδιαγέρτης φυτών

Συστατικά:

Λεοναρδίτης¹ (CAS no.129521-66-0)
και υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη¹
(CAS no. 100209-45-8)

ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών



Το BlackRock® είναι βιοδιαγέρτης που δημιουργήθηκε για να βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών τόσο στο υπέργειο μέρος αυτών, όσο και στο ριζικό τους σύστημα. Το BlackRock® είναι κατάλληλο για εφαρμογές στο έδαφος, καθώς και για διαφυλλικούς ψεκασμούς.

Το BlackRock® είναι συμβατό με πολλά προϊόντα φυτοπροστασίας και λιπάσματα. Σε περίπτωση ανάμιξης, είναι ευθύνη του χρήστη να κάνει δοκιμή πριν την εφαρμογή. Ανακινήστε το προϊόν πριν τη χρήση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε το σε δροσερό και χωρίς υγρασία μέρος, σε θερμοκρασία από 0-40°C και μην το εκτίθετε στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

P102 Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

EUH208 Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777.

Ημερομηνία παραγωγής: Δείτε τη συσκευασία

Ημερομηνία λήξης: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Αριθμός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία

Παρασκευαστής:

Sofbey SA, Via S. Martino, 16/A 6850 Mendrisio, Ελβετία

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

SIPCAM Ελλάς Μ.Α.Ε.

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Κορωπί Αττικής, 19441

Τηλ. 210522 38 34, e-mail info@sipcam.gr