

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Υπαίθρου & Θερμοκηπίου (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Φασόλι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Αγγούρι, Λάχανο, Μπαρούλι, κ.τ.λ.)	Ριζοτόπια: Μετά τη μεταφύτευση: 0,5 – 1 λίτρο/στρ. Καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο: 400-600 κ.εκ./στρ./εφαρμογή	Εφαρμόζεται με διαφυλλικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικές ουσίες ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε δοσολογία 50 κ.εκ./στρ., όταν τα φυτά έχουν ύψος 20-25 cm. Ένα ένα σπασμένο σπασμάδατε την ίδια εφαρμογή 3 εβδομάδες αργότερα.
ΦΡΑΥΓΙΑ, ΣΜΕΟΥΡΑ, ΜΥΡΤΙΛΙΑ	Ριζοτόπια: 200-300 κ.εκ./στρ. 6 εφαρμογές κάθε δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου	
ΕΣΤΕΡΑΒΕΙΑ, ΜΗΛΟΒΙΑ, ΠΥΡΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΜΙΓΔΑ, ΕΛΕΙ, ΜΠΑΝΑΝΑ, κ.τ.λ.	Κατά την έναρξη της βλάστησης εφαρμόστε 25 κ.εκ. NUTEX BLACK® /10 λίτρα νερό σε κάθε δένδρο.	Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται με διαφυλλικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικές ουσίες ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε δοσολογία 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό με σπ' ευθείας ψεκασμό πάνω στα φύλλα.
	Ριζοτόπια: 200-400 κ.εκ./στρ./εφαρμογή μαζί με υδατοδιαλυτό λίπασμα.	
ΠΑΤΑΤΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΚΑΡΟΤΟ, ΠΡΑΣΟ, ΣΕΛΙΝΟ, κ.τ.λ	Εφαρμόγ. στη γραμμή: Μετά την προετοιμασία του εδάφους και/ή αργότερα από τη σπορά 200-400 κ.εκ./στρ.	1η Εφαρμογή: 100-200 κ.εκ./στρ. όταν τα φυτά έχουν ύψος 20-25 cm. 2η Εφαρμογή: επανάληψη της εφαρμογής 15-20 ημέρες αργότερα.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΙΤΑΡΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΗΛΙΑΘΟΣ, ΣΟΓΙΑ κ.τ.λ.	Εφαρμόγ. στη γραμμή: Μετά την προετοιμασία του εδάφους και/ή αργότερα από τη σπορά 200-400 κ.εκ./στρ.	1η Εφαρμογή: 50-100 κ.εκ./στρ. όταν τα φυτά έχουν ύψος 20-25 cm. 2η Εφαρμογή: Επανάληψη της εφαρμογής 15-20 ημέρες αργότερα.
	Στάθμη άρδευσης: 5-6 εφαρμογές ανά περίοδο με δόση 250 κ.εκ./στρ.	ΤΟ NUTEX BLACK® μπορεί να συνδυαστεί με διαφυλλικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικές ουσίες ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
ΖΑΧΑΡΟΥΛΙΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ	Εφαρμόγ. στη γραμμή: Μετά την προετοιμασία του εδάφους ή/και αργότερα από τη σπορά με 200-400 κ.εκ./στρ.	1η Εφαρμογή: 10-12 εβδομάδες μετά τη σπορά σε δοσολογία 200 κ.εκ./στρ. 2η Εφαρμογή: Επανάληψη της εφαρμογής 2 εβδομάδες αργότερα.
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (εαρινής εγκατάστασης)	Εφαρμόστε 250 κ.εκ. σε αρκετό όγκο νερού, για την κάλυψη 1 στρέμματος πριν από τη σπορά ή την εγκατάσταση του έτοιμου γλοσάπτη.	Εφαρμόστε 125-155 κ.εκ. σε επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη ενός στρέμματος. Ίδια ποσά στις αρχές της άνοιξης και επανάληψη στα τέλη του φθινοπώρου.
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (χειμερινής εγκατάστασης)	Εφαρμόστε 250 κ.εκ. σε αρκετό όγκο νερού, για την κάλυψη 1 στρέμματος πριν από τη σπορά ή την εγκατάσταση του έτοιμου γλοσάπτη.	Εφαρμόστε 125-155 κ.εκ. σε επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη ενός στρέμματος μία φορά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι.
ΚΑΛΟΘΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΣΕ ΠΑΡΤΕΡΙΑ	Δέντρα και θάμνοι: Εφαρμόστε 140 κ.εκ. σε 20 λίτρα νερό κάτω από την κόμη των μικρών δέντρων και θάμνων μεσαίου μεγέθους. Παρεμφαλά δένδρα εφαρμόστε 280 κ.εκ. σε 40 λίτρα νερό που διανέμειται ομοιόμορφα κάτω από την κόμη. Καλλυπτικά φυτά σε πορτέρια: Εφαρμόστε 30 κ.εκ. σε αρκετό νερό για να καλύψουν 10 τετρ. μέτρα πριν τη φύτευση.	Για τα μικρά δέντρα, θάμνους και καλλυπτικά φυτά, ψεκάστε την κόμη με 1 κουτάλι της σούπας για κάθε 4 λίτρα νερό, μετά την πλήρη εκτίναξη των φύλλων.
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ	Μικροί σπόροι (σάβδα, κριθάρι, βρώμη): 500 κ.εκ. NUTEX BLACK® ανά 100 λίτρα νερού. Μεγάλοι σπόροι (βραχόλι, πεππας, κασσιδιεργμύδι κ.τ.λ.): 250 κ.εκ. NUTEX BLACK® ανά 100 λίτρα νερού.	24 ώρες πριν από τη σπορά, εμβάπτιση/εναπόθεση τους σπόρους σε ένα διάλυμα NUTEX BLACK® στη συνιστώμενη δόση για να επιτύχετε γρήγορη φυρνωσιμότητα.
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ (EDDHA 6 % αλάρη)	250 κ.εκ. NUTEX BLACK® + EDDHA 6% χηλικό σίδηρο στο στρέμμα	Εφαρμογή μέσω στάθμης άρδευσης. Συνήθως έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη απορρόφηση του χηλικού σιδήρου και τη γρήγορη διάρρηξη της τροφολέπιδας.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	– Κηπευτικά: Εφαρμόστε σε δόση 0,5-1 λίτρο/στρ. και μετά κάθε 3-4 εβδομάδες σε δόση 400-600 κ.εκ./1000m ² . – Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (βραβόκα, καλαμπόκι, δημητριακά, κ.τ.λ.): Εφαρμόστε σε δόση 250 κ.εκ./στρ.	Αμέσως μετά τη μεταφύτευση, επανάληψη εφαρμογής 3-4 φορές καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο.
ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ pH ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΥΘΙΟ	Χρησιμοποιείτε το NUTEX BLACK® σε διάλυμα 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό.	


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε το ΠΡΟΪΟΝ στη συνιστώμενη δόση, καθώς επίσης και τα διαφυλλικά λιπάσματα ή/και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Ανακινήστε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο καθώς απογειώνετε με νερό και στη συνέχεια ψεκάστε. **Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις.**
Δηλωσεις προφυλάξεων: P102 Μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Nutex Black®

Συμπυκνωμένο εναιώρημα λεοναρδίτη πλούσιο σε χουμικά και φουλβικά οξέα υψηλής αποτελεσματικότητας (Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών)

Κυκλοφορεί για χρήση στη Γεωργία σύμφωνα με την ΚΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 358/16.01.2004)

Το NUTEX BLACK® είναι ένα συμπυκνωμένο υδατικό εναιώρημα χουμικών οξέων κατάλληλο για εφαρμογή στο έδαφος (καθολικά, γραμμικά, με στάθμη άρδευσης) και σε διαφυλλικές εφαρμογές



Nutex Black®

Σύνθεση

Χουμικά οξέα + Φουλβικά οξέα + Χουμίνη: 25% (β/β) min
pH = 4 – 5

Παρασκευαστής: SIPCAM INAGRA, S.A. Prof. Beltran Bágua, 5 46009 VALENCIA

Tel: 963 483 500

Διανομέας: SIPCAM HELLAS Μ.Α.Ε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορυμπι - Αττική Τηλ. : 210 5223834

Περιεχόμενο: 1,1 Kg= 1 L

® Εμπορικό σήμα SIPCAM S.p.A.

Το NUTEX BLACK® χάρει στο φυσικής προέλευσης όξινο pH:

- Μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσματα.
- Βοηθά τις ρίζες να απορροφούν πιο εύκολα και γρήγορα μεγαλύτερη ποσότητα σημαντικών μικροθρεπτικών συστατικών (Fe, Mn, κ.λ.π.).
- Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Το NUTEX BLACK® εφαρμόζόμενο στο έδαφος δρά με φυσικό τρόπο και βοηθά στη βελτίωση της δομής του εδάφους, στη μείωση της αλατότητας, αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, προωθεί τη μικροβιακή δραστηριότητα και αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων των μακρο και μικροστοιχείων. Δρα επίσης ως φυσικός χηλικός παράγοντας για τα στοιχεία (μακρο και μικρο) συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση των στοιχείων αυτών και στην εν συνεχεία μετακίνηση τους μέσα στο φυτό.

Το NUTEX BLACK® μειώνει το pH του ψεκαστικού διαλύματος φυτοφαρμάκων ή/και διαφυλλικών λιπασμάτων όταν αυτό είναι αλκαλικό. Έτσι ενισχύεται η απορρόφηση και η ταχύτητα δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των διαφυλλικών λιπασμάτων.

Με το NUTEX BLACK® επιτυγχάνεται υψηλή αποτελεσματικότητα σε χαμηλές δόσεις και συγχρόνως είναι εύκολο στη χρήση στην εύκολη και γρήγορη διαλυτότητά του. Το προϊόν φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C. Όταν αποθηκεύεται κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, το προϊόν διατηρεί τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητές του για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Λόγω της σύνθεσης και του pH, το NUTEX BLACK® είναι συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να γίνονται προληπτικές δοκιμές συνδυαστικότητας σε μικρές επιφάνειες.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.