

Το **THYSSANON** είναι ένα εξελιγμένο σύμπλοκο παρασκευάσμα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα ακόμα και αν υπερβληθούν οι δοσολογίες. Αντίθετα βοηθάει τα φυτά να ξεπεράσουν φυτοτοξικές ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις. Προάγει την ταχεία ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και είναι κατάλληλο για φιντάνια, μοσχεύματα, μεταφτευμένα φυτά και νεαρά φυτά. Επιπλέον είναι ένας άριστος τρόπος ανάπτυξης και συντήρησης δοκιμαζόμενων εγκαταστάσεων χλοοταπτήτων, χώρων αθλοπαιδιών, γηπέδων γκολφ, χώρων αναψυχής κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα προγράμματα λίπανσης. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, συστήματα άρδευσης, ριζοποτίσματα και εκχύσεις στο έδαφος.

Με την εφαρμογή του **THYSSANON** επιτυγχάνεται:

- Δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος και καλύτερη εγκατάσταση των φυτών
- Επιτάχυνση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων
- Διέγερση μηχανισμών σχηματισμού της χλωροφύλλης
- Επιμήκυνση της περιόδου ανάπτυξης και του χρόνου ζωής των φυτών
- Επιμήκυνση της παραγωγικής περιόδου
- Εντονότερος ρυθμός ανάπτυξης
- Πρωίμηση της παραγωγής
- Αύξηση της εκμεταλλευσιμότητας των λιπασμάτων
- Μεγαλύτερη αντοχή των φυτών σε αντίξοες συνθήκες
- Αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας των καλλιεργειών

Παρασκευαστής/Διανομέας:  
**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ**  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,  
Κορωπί-Αττική, Τηλ. 210 5223834



**SIPCAM**  
HELLAS

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ **1 L (1Kg)**

# THYSSANON

**6 - 0 - 2**

**ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ**

**Ομάδα Γ: Οργανοχημικό λίπασμα κύριων στοιχείων με ιχνοστοιχεία**

**Αρ. Κυκλοφορίας: 117**

**Φυσικός διεγέρτης ριζοβολίας  
και ενδυνάμωσης των καλλιεργειών.**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: β/β**

**Άζωτο ολικό (N): 6%**

**Ουρικό Άζωτο: 5%**

**Κάλιο ολικό (K<sub>2</sub>O): 2%**

**Σίδηρος Fe: 280 mg/kg**

**Μαγγάνιο Mn: 6 mg/kg**

**Ψευδάργυρος Zn: 2 mg/kg**

**Χαλκός Cu: 1,5 mg/kg**

**Οργανική ουσία (min): 5%**

**Χουμικά Εκχυλίσματα: 7,6%**

**Εκχυλίσματα φυκιών: 4,8%**

**Βιταμίνη C (Ascorbic Acid): 3,8%**

**Βιταμίνη B1 (Thiamine): 0,4%**

**Βιταμίνη E (Alpha Tocopherol): 0,2%**

**Glycine: 1,2%**

**pH: 9,1**

**Αγωγιμότητα (mS/cm): 107**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ**

**Φυτώρια - μοσχεύματα:** 80 - 100 cc / 100 lit. Διαβρέχουμε το υπόστρωμα κάθε δύο εβδομάδες μέχρι λίγο πριν να γίνει η μεταφύτευση.

**Μεταφύτευση:** 1,3 - 1,8 lit το στρέμμα, προστιθέμενο στο νερό της μεταφύτευσης.

**Τομάτα - αγγούρι - πιπεριά - λάχανο - μαρούλι - κουνουπίδι - σέλινο - μπρόκολο - καρτότο - κρεμμύδι - ραϊτανό - σπανάκι - ρεπάνι - σπαράγγι - καρπούζι - πεπόνι - κολοκύθι:** 1,3 - 1,8 lit το στρέμμα. Εφαρμόζουμε με τα συστήματα άρδευσης. Συνιστώνται δύο επεμβάσεις, η πρώτη στο στάδιο των δύο φύλλων και η δεύτερη τρεις εβδομάδες αργότερα.

**Καπνός - σόγια - φασόλι - πατάτα - σακχαρότευτλα - ρύζι - μελιτζάνα - μπάμι - φρούλα - βαμβάκι:** 1,3 - 1,8 lit το στρέμμα. Εφαρμόζουμε με τα συστήματα άρδευσης. Συνιστώνται δύο επεμβάσεις, η πρώτη όταν τα φυτά έχουν ύψος 10-20 cm και η δεύτερη 3-4 εβδομάδες αργότερα.

**Γυμνόριζα δένδρα:** 0,7 - 1 lit / 100 lit. Εμβάπτιση των ριζών για τουλάχιστον 3 λεπτά πριν τη φύτευση.

**Διαφυλλικοί ψεκασμοί:**

Ψεκάσουμε με διάλυμα 0,7 - 1 lit σε 100 κιλά νερό.

**Χλοοτάπητες - αθλητικοί χώροι - γήπεδα γκολφ - νέες εγκαταστάσεις κλπ.:** Εφαρμόζουμε με 0,7 - 1 lit το στρέμμα.

**Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν αργίλιο.

**Αποθήκευση:** Να φυλάσσεται κλειστό σε σκιερό και δροσερό μέρος.

**Προφυλάξεις:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση και μεταχείριση του προϊόντος.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία εφόσον ζητηθεί.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης.**

**Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεδειγμένων δόσεων.**

**ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**