



CORTINA®

EFICACIA EN 3 ACTOS



- Tecnología EOSOL™, exclusiva y patentada por el Grupo SIPCAM.
- Riqueza de principio activo más elevada del mercado.
- Más estable y seguro para cultivos y usuarios.
- Triple acción: preventivo, curativo y erradicante.
- Versátil, cómodo de usar y compatible en estrategias GIP.

sipcam.com/es






¿QUÉ ES CORTINA®?

CORTINA® es un fungicida multidiana destinado al control de enfermedades como mancha ocre, helmintosporium, septoria, cercospora, oídio y royas. Es una herramienta formulada con la tecnología EOSOL™, una **formulación exclusiva y patentada** del grupo SIPCAM. Esta tecnología permite contener la riqueza de activo más elevada del mercado y estar registrado en **almendro y remolacha**, ayudando así a la gestión de resistencias a fungicidas. Además, gracias a su formulación se mejora su estabilidad, absorción y sistemia teniendo triple acción: **preventivo, curativo y erradicante**; y a 3 niveles: molecular, celular y fisiológico vegetal. Versátil, cómodo de usar y compatible en estrategias GIP.

Nº de Registro: ES-01914

MODO DE ACCIÓN



¿QUÉ APORTA LA TECNOLOGÍA EOSOL™?

- Permite una **mayor concentración** del ingrediente activo en el producto final, superando las limitaciones por la solubilidad máxima de las formulaciones EC reduciendo así residuos y costes de transporte.
- **Mejora la estabilidad** durante el almacenamiento: minimizando la degradación química del ingrediente activo durante el almacenamiento, una preocupación común en las formulaciones EC.
- Proporciona una **aplicación más segura** para los cultivos y para los usuarios.
- Tiene una **gran estabilidad** fisicoquímica incluso a pH bajo (2-3,5).



USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	N.º Máx Aplic	Intervalo	P.S.
Almendro	Mancha ocre (<i>Polystigma</i> spp.)	0,4	1	-	3
Remolacha azucarera	Cercosporiosis de la remolacha (<i>Cercospora beticola</i>) Oídio de la remolacha (<i>Erysiphe betae</i>) Roya de la remolacha (<i>Uromyces betae</i>)	0,3 - 0,4	2	14 días	28
Trigo	Fusariosis (<i>Fusarium</i> spp.) Roya (<i>Puccinia</i> spp.) Septorios del trigo (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	0,4 - 0,5	1	-	35
Cebada	Helmintosporiosis reticular de la cebada (<i>Pyrenophora teres</i>) Roya parda o enana de la cebada (<i>Puccinia horde</i>)				