

Turbine

Pendimethalin (πεντιμεθαλίν)
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pendimethalin: 36,5% β/ο (40,55% β/β)
βοηθητικές ουσίες: 64,02% β/β



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακάσιμιο.



Ύποπο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

UFI: 15YY-GT82-530U-1VM0

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Περιεχόμενο: 5 lt
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗ-
ΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
Αρ.Πρωτ. ΥΑΑΤ:
13185/130059/13-3-2013

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος
εμπορίας στην Ελλάδα:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Κορωπί 19400,
Τηλ.: 210 5223834, e-mail: info@sipcam.gr

ZIZANIOKTONO

5L

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ►

GR02/10-2023/1



Turbine

Παρατηρήσεις: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TURBINE. Προετοιμάστε καλή σποροκλίνη, επίπεδη, ψιλογυμνασμένη και αρκετά συμπαγή. Ποτίστε εάν δεν βρέξει μέσα σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή ώστε να ενσωματωθεί το φάρμακο στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς τουλάχιστον 3 εκ. για τα καρότα και τα κρεμμυδιά και 4 εκ. για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, έτσι ώστε να μην έσκεπάζονται ή μένουν σπόροι στην επιφάνεια. Στις μεταφυτευμένες καλλιέργειες (τομάτα, πιπεριά και καπνό) εφαρμόστε το TURBINE σε καλά ψιλογυμνασμένο έδαφος τουλάχιστον 7-8 ημέρες πριν την μεταφύτευση. Ενσωματώστε με ελαφρύ πότισμα το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά την μεταφύτευση. Σε καμία περίπτωση μη κάνετε “γέμισμα” (τράβηγμα χώματος στην ρίζα) πριν περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την εφαρμογή. Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). Μετά την εφαρμογή, πλύνετε καλά το ψεκαστικό και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που επιβάλλεται επανασπορά σε ψεκασμένο έδαφος, αποφύγετε την επαφή του νέου σπόρου με το φάρμακο, σπέρνοντας σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς την μετακίνηση του επιφανειακού εδάφους ή οργανώνοντας σε βάθος τουλάχιστον 20 εκ. το οποίο είναι απαραίτητο εάν η αρχική καλλιέργεια αντικατασταθεί με ζαχαρότευτλο. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων. Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (*Thuja occidentalis*), είδη Pinus sp., Κουπρεσκούπαρις (*Cypressocaryis leylandii*) Βιβούρνο (*Viburnum* sp.), Κράταιγος (*Crataegus* sp.), Ήμερο πουνύραρι (*Ilex* sp.), Παρχολιά (*Syringa vulgaris*), Μανόλια (*Magnolia grandiflora*), Δρυς (*Quercus* sp.), Φοινίκας (*Phoenix* sp.), Πεύκο (*Pinus* sp.), Λευκα (*Populus alba*), Πλάτανος (*Platanus occidentalis*), Ιτιά κλαίουσα (*Salix babylonica*), Καρυδιά (*Juglans nigra*), Ροδόδε-ντρο (*Rhododendron* sp.), Πυξός (*Buxus* sp.), Καμέλια (*Camelia japonica*), Γαρδένια (*Gardenia jasminoides*), Κυδωνιάστρο (*Cotoneaster* sp.), Κυπαρίσις (*Cupressus sempervirens*), Ευώνυμο (*Euonymus japonicus*), Πυράκανθα (*Pyracantha coccinea*), Φορσυθία (*Forsythia intermedia*), Ιβίσκος (*Hibiscus syriacus*), Άρκευθος (*Juniperus* sp.), Λεβάντα (*Lavandula angustifolia*), Αγγελική (*Pittosporum tobira*), Μυρτιά (*Myrtus communis*), Πικροδάφνη (*Nerium oleander*), Χαμαίριπας (*Chamaerops* sp.), Φωτίνια (*Photinia* sp.), Λιγούστρο (*Ligustrum* sp.), Δάφνη Απόλλωνος (*Laurus nobilis*), Γιούκα (*Yucca* sp.), Κισσός (*Hedera helix*), Πελαργόνιο (*Pelargonium* sp.), Γιοσεμί (*Jasminum* sp.), Μυόπορο (*Myoporium parviflorum*), Σπαράγγι (*Asparagus officinalis*), Φρέζια (*Freesia* sp.), Λίλιουμ (*Lilium* sp.), Παίωνια (*Paeonia* sp.), Γλυτσίνα (*Wisteria* sp.), Αμμορφίλια sp.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευμένης καλλιέργειας: 1) Σόγια, βαμβάκι, μπίζελι, σκόρδο, ηλίανθος και μεταφυτευμένες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του TURBINE, αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ). 2) Πατάτα μπορεί να φυτευτεί 3 μήνες μετά την εφαρμογή του TURBINE αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 1) Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν 6 μήνες μετά την εφαρμογή του TURBINE αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ). 2) Ζαχαρότευτλα μπορούν να σπαρθούν 10 μήνες μετά την εφαρμογή του TURBINE αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό και καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα - κοτυληδόνας). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλια ή βοτάνωμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Η εκλεκτικότητα ως προς τις παραπάνω καλλιέργειες που σπέρνονται εξαρτάται άμεσα από την τήρηση των οδηγιών του χρόνου και του βάθους σποράς. Σε περίπτωση ανομοιομορφής σποράς σε πολύ μικρό βάθος, η εκλεκτικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη, ειδικά εάν ακολουθήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την εφαρμογή. Οι μεταφυτευτικές εφαρμογές πρέπει να γίνονται 7-8 ημέρες πριν την εγκατάσταση των φυτών, στα οποία δεν πρέπει να γίνει γέμισμα (τράβηγμα χώματος στην ρίζα) πριν περάσει ένας μήνας. Στα κρεμμυδιά, καρότα, καλαμπόκι και ηλίανθο, χρησιμοποιήστε τις μικρότερες δόσεις στα ελαφρά εδάφη. Κατά τις εφαρμογές σε καλλωπιστικά φυτά, το σκέυασμα να μην έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα ή τα μη καλά ξυλοποιημένα μέρη των φυτών. Το σκέυασμα μπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται σε αυτή την ετικέτα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκέυασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι ψιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκα-στικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπτάρι, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: –

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά. Χρησιμοποιείτε μικτ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρό-τερη από 3 – 4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Παρατηρήσεις: Το TURBINE είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητά του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμη-τες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, αναμένεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δο-κιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το TURBINE σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το TURBINE σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους σφθαιμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδα-φος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του TURBINE με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του TURBINE πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστι-κών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί TURBINE κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το TURBINE πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση.

GR02/10-2023/2

Turbine

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανισθεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό». Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από την χρήση.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων. **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προ-

φυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Αμπέλι:** Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά το λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης). **Καρότο:** Δόση 200-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Κρεμμύδι, Σκόρδο:** Δόση 100-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο των 2-3 φύλλων). **Τομάτα, Πιπεριά:** Δόση 125-220 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Μαρούλι:** Δόση 150-200 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Αρακάς:** Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Φασολάκια νωπά:** Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Όσπρια** (Φασόλι): Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Ηλιανθος:** Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Σόγια:** Δόση 200-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Βαμβάκι:** Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Πατάτα:** Δόση 170-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Σιτάρι:** Δόση 170-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Αραβόσιτος:** Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Καπνός:** Δόση 125-300 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Καλλωπιστικά:** Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

Στόχος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο στόχος είναι: **Ετήσια ζιζάνια*** (αγρωσώδη και πλατύφυλλα).

Όγκος ψεκαστικού δ/τος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο όγκος του ψεκαστικού δ/τος είναι: 20-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος είναι: **1**

*** Ευαίσθητα ετήσια αγρωσώδη ζιζάνια:** *Alopecurus myosuroides* (αλεπονουρά), *Digitaria sanguinalis* (αιματοχόρτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Panicum dichotomiflorum* (πάνικο διχοτομικό), *Setaria viridis* (σετάρια πράσινη), *Setaria verticillata* (σετάρια σπονδυλωτή), *Poa annua* (κοινή πόα).

*** Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:** *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Amaranthus blitoides* (πλαγιάστο βλήτο), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Capsella bursa-pastoris* (καφέλλα), *Cardamine hirsuta* (καρδαμίνια), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Euphorbia spp.* (γαλατσίδες), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Polygonum aviculare* (πολυκώμμι), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Bilderdýkia convolvulus* (αναρριχώμενο πολύgono), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Solanum nigrum* (αγριοιονταμάι ή στύφνος), *Sonchus oleraceus* (ζωχός), *Stachys annua* (στάχυς), *Stellaria media* (στελλάρια), *Urtica urens* (μικρή τσουκνίδα), *Veronica hederifolia*, *Veronica persica* (βερόνικα), *Viola arvensis* (κοινός αγριοπανσές).

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. Παρασκευής:

GR02/10-2023/3