

SCHEDA PRODOTTO

Composizione	Cletodim, 120 g/l Pyraflufen Etile, 10 g/l
Formulazione	EC - Coadiuvante di origine naturale incluso nella formula
Meccanismo di azione	Cletodim: Inibizione dell'Acetyl-CoA Carbossilasi (ACCase) HRAC: I Pyraflufen etile: Inibitore ProtoPorfirinogenoOssidasi (PPO) HRAC: I4
Numero massimo di applicazioni colture e modalità d'impiego	1 applicazione all'anno: Vite, Pomacee, Drupacee, Frutta a guscio (eccetto mandorlo), Kiwi, Melograno, Kaki, Terreni agrari in assenza della coltura: set-aside e stoppie, capezzagne. 2 applicazioni all'anno, (con un intervallo minimo di 20 giorni): Agrumi, Mandorlo e Olivo. Dose: 1,5 - 2 l/ha Applicare in post-emergenza delle infestanti. - per le dicotiledoni dalle 3 alle 8 foglie - per le graminacee fino alla fine dell'accestimento
Tutela dell'ambiente	Su vite e fruttiferi: trattare con attrezzature schermate e limitare l'applicazione al sottofila/sottochioma, impiegando il prodotto al massimo sul 30% della superficie d'impianto. Rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dalle zone non coltivate per proteggere le piante e gli artropodi non bersaglio. Su pomacee, drupacee, frutta a guscio, melograno e kaki: non applicare su suoli sabbiosi Su set-aside, stoppie e capezzagne: limitare l'applicazione al 30% della superficie, trattare ad anni alterni e con una riduzione della deriva del 90%.
Numero di registrazione	Reg. n 18893 del 08.04.2026
Confezioni	1L (x10), 5L (x4)

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

E/26



UN ULTIMO SALUTO ALLE MALERBE

ESCLUSIVA SIPCAM

NOVITÀ!



scopri sul sito
sipcam.com

Dire addio alle infestanti non è mai stato così semplice. Grazie a **RIPPER**®, l'unico erbicida ad azione totale con attività complementare spollonante per tutte le arboree, il controllo delle infestanti, anche resistenti, diventa definitivo.

La sinergia tra Cletodim e Pyraflufen-etile accelera l'azione di **RIPPER**® eliminando le graminacee alla radice e garantendo il disseccamento delle dicotiledoni e dei polloni in poche ore.



IL POTERE DELLA SINERGIA!

RIPPER® è l'unico erbicida ad azione totale con un'attività complementare spollonante.

L'innovativa formulazione di **RIPPER®** conferisce un'incredibile **sinergia di azione dei due principi** attivi che incrementano le loro **velocità di azione** ed efficacia nei confronti delle malerbe bersaglio. Mentre il **Cletodim** ha un'efficacia sistemica eccellente su tutte le malerbe a foglia stretta, il **Pyraflufen-etile** ha un'azione di contatto perfetta sulle dicotiledoni e sui polloni.

DUE MODI D'AZIONE RIVOLUZIONARI IN UN UNICO PRODOTTO

Cletodim è un graminicida sistemico che agisce inibendo l'enzima ACCasi, bloccando la sintesi degli acidi grassi essenziali nelle graminacee.

 **Rapida penetrazione e traslocazione, elimina le graminacee alla radice.**

 **Pregi:** ottima efficacia su graminacee annuali e perenni, sistemica completa, rapidità di assorbimento.

 **Spettro d'azione:** *Echinochloa, Digitaria, Setaria, Lolium, Sorghum, Agropyron, Cynodon, etc.*

Pyraflufen-etile è un erbicida di contatto ad azione estremamente rapida che agisce inibendo la ProtoPorfirinogeno Ossidasi (PPO), causando la distruzione immediata delle membrane cellulari delle infestanti.

 **Disseccamento visibile già dopo poche ore.**

 **Pregi:** rapidità d'azione, elevata selettività, ottimo partner in miscela.

 **Spettro d'azione:** infestanti dicotiledoni giovani e polloni erbacei.

QUALI MALERBE CONTROLLA?

Monocotiledoni

Specie sensibili

Cynodon dactylon (Gramigna rossa), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella comune), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Eleusine indica* (Gramigna indiana), *Lolium spp.* (Loietto), *Poa spp.* (Poa), *Setaria viridis* (Setaria), *Sorghum halepense* (Sorghetto).

Specie mediamente sensibili

Avena spp. (Avena), *Bromus spp.* (Bromo), *Hordeum spp.* (Orzo selvatico).

Dicotiledoni

Specie sensibili

Amaranthus spp. (Amaranto), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Diploaxis erucoides* (Ruchetta), *Erigeron canadensis* (Saeppola), *Malva sylvestris* (Malva), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Portulaca oleracea* (Portulaca), *Rumex acetosa* (Acetosa), *Senecio vulgaris* (Senecio), *Sonchus spp.* (Grespino), *Stellaria media* (Stellaria), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Urtica urens* (Ortica), *Veronica persica* (Veronica).

Specie mediamente sensibili

Geranium spp. (Geranietto), *Oxalis acetosella* (Acetosella), *Trifolium spp.* (Trifoglio).

SU QUALI COLTURE È AUTORIZZATO?

ARBOREE



Vite, Pomacee, Drupacee



Frutto a guscio, Actinidia, Kaki, Melograno
(eccetto mandarino)



Olivo, Mandorlo, Agrumi

ALTRI IMPIEGHI

Terreni agrari in assenza della coltura: Set-aside e Stoppie, Capezzagne.

MODALITÀ D'IMPIEGO

1 applicazione
(limitata al sottofila/
sottochioma)

2 applicazioni
(limitate al sottofila/
sottochioma)

1 applicazione
(ad anni alterni)

1,5 – 2 L/ha

Applicare
sul 30%
della superficie

MODALITÀ DI IMPIEGO

RIPPER® si deve applicare in post-emergenza delle erbe infestanti, dalle 3 alle 8 foglie per le dicotiledoni e fino alla fine dell'accestimento per le monocotiledoni. Per il controllo di *Erigeron spp.* è indispensabile intervenire entro la fase di rosetta.

PERCHÈ SCEGLIERE RIPPER?

SINERGICO

I due principi attivi agiscono tra loro in sinergia accelerando ed incrementando l'attività di controllo sia sulle foglie larghe che sulle strette.

GLIFOSATE FREE

Per un controllo efficace e completo anche senza l'utilizzo di Glifosate.

ETICHETTA AMPIA

Autorizzato l'uso su tutte le frutticole e la vite.

UNICO

Unica formulazione pronta a base di Pyraflufen-etile e Cletodim.

ANTI RESISTENZA

Sulle arboree nessuna resistenza nota al Pyraflufen-etile e al Cletodim.

FLESSIBILE

Dose flessibile per complementarne l'azione con un partner specifico (es: Fenoxilene 200, Rexxar, ecc.)

