

Stilo Hydro L

Bioestimulante líquido
A base de aminoácidos
con actividad osmorreguladora

Formulación:
Concentrado Soluble (SL)

Envase: 5 litros

Importado y Distribuido por:
SIPCAM CHILE S.p.A.
Av. Andres Bello 2687, Of. 1701
Las Condes, Santiago, Chile

Producido por:
SOFBEY S.A. en la planta
de Sipcám Inagra, S.A.
Valencia, España

5 L



Lote de producción:
ver embalaje
Fecha de producción:
ver embalaje
Fecha de vencimiento:
ver embalaje

Stilo Hydro L

Recomendaciones de Uso:

Determinaciones (p/v):

Aminoácidos libres: 8,35 %

Nitrógeno (N) total: 5,78 %

Nitrógeno (N) orgánico: 5,76 %

Densidad: 1.092 g/L a 20° C

pH: 8,01

Metales pesados s.m.o. (mg/kg):

As: < 2,00; Cd: < 0,50; Hg: < 0,20;

Pb: < 2,00

Características:

Stilo Hydro L es una especialidad nutricional con un marcado efecto protector y corrector del estrés abiótico. Está especialmente concebido para proteger los procesos celulares de los cultivos en periodos de estrés abiótico (calor, frío, sequía, salinidad, deshidratación, insolación, humedad...), lo que se traduce en un mayor rendimiento y una mejor calidad de la fruta. La aplicación de Stilo Hydro L permite aumentar los niveles de osmorreguladores en situaciones de estrés, ayudando al cultivo a mantener la tasa fotosintética, el equilibrio de su potencial osmótico y la promoción de la actividad enzimática de forma tal que las plantas completen sus procesos fisiológicos.

Precauciones: Stilo Hydro L puede mezclarse con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Almacenamiento: Conservar el producto en su envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre 4°C y 30°C

Teléfono de emergencia: RITA CHILE + 56 2 2777 1994.

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis mL/100 L agua
Manzano, Peral, Durazno, Damasco, Cerezo, Nogal, Almendro, Avellano, Granado, Kiwi, Nectarín, Palto, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivo, Chirimoyo, Papayo, Uva de mesa, Uva vinífera	Desde inicio floración hasta la Cosecha.	200 - 350
Tomate, Pimiento, Berenjena, Aji, Lechuga, Espinaca, Acelga, Apio, Radicchio, Camote, Coliflor, Brócoli, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo, Arveja, Poroto, Haba, Lenteja, Garbanzo, Acelga, Alcachofa, Raps, Maíz, Patata, Zanahoria, Cebolla.	A partir de la floración y durante el crecimiento del fruto. Para las hortaliza de raíz, bulbo y tubérculo, aplicar después del inicio de la formación de los órganos subterráneos.	200 - 350
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Zarparrilla, Murta, Mora, Grosella	Desde la floración hasta la recolección. 3-4 aplicaciones por temporada.	200 - 350

Dosis recomendadas por aplicación foliar. En caso de fertirrigación, dosificar de 4 a 6 l/ha y mezclar el producto con una cantidad adecuada de agua.