

CARACTÉRISTIQUES

Agroil Blue agit par contact, pénètre dans les trachées des insectes provoquant la mort par suffocation.

USAGES AGRICOLES

Le produit peut être appliqué par pulvérisation normale avec tracteur ou manuel avec sac à dos ou lance-pistolet.

Cultures	Dose	Ravageurs	D.A.R.
Agrumes	20 à 45 L/ha	Cochenilles	Pas applicable
Arbres fruitiers	6 à 10 L/ha	Araignées	
Oliviers	7,5 à 15 L/ha	Pucerons	
Bananiér	15 à 37,5 L/ha	Mouche blanche	

CONSEIL D'EMPLOI ET COMPATIBILITÉ

Agroil Blue doit être utilisé en pulvérisation normale sur la culture. Pour préparer le mélange, remplissez le réservoir du pulvérisateur à mi-course et avec l'agitateur en marche, ajouter le produit à la concentration appropriée. Puis, remplissez d'eau jusqu'à la quantité conseillée, en remuant continuellement jusqu'à son homogénéisation parfaite. Le succès du traitement dépendra fondamentalement de la répartition uniforme sur la culture. Ne pas appliquer ce produit en cas de risque de gel ni pendant les journées chaudes et sèches. Ne pas appliquer avec produits avec captan, dinocap, folpet, soufre ou avec chlorothalonil. Est nécessaire au moins 40 jours depuis l'application avec soufre et au moins 30 jours depuis l'application avec chlorothalonil et vice versa.

MENTIONS DE DANGER ET PRECAUTIONS

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P261 : Éviter de respirer vapeurs.

P262 : Éviter tout contact avec les yeux,

la peau ou les vêtements.

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements

de protection/un équipement de protection du visage.

P391 : Recueillir le produit répandu.

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Stockage : Conserver le produit dans un endroit frais et bien ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et de tests vastes et rigoureux. Néanmoins, au cours de l'application de nombreux facteurs peuvent se produire qui sont hors de notre contrôle (préparation des mélanges, application, conditions météorologiques, etc.). Notre société garantit la composition, la formule et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (défaut d'efficacité, toxicité en général, résidus, etc.), pour ne pas suivre les instructions sur l'étiquette.

Agroil Blue®

أكرويل بلو

Insecticide
Concentré émulsifiable (EC)

مبيد حشري
سائل مركز قابل للاستحلاب

COMPOSITION

Huile de paraffine 83% p/v

زيت البارافين 83% وزن/حجم

التركيبية

تسجيل عدد: 23 62 176 Homologation N°

Fabriqué par :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Baguena, 5-11
46009 VALENCIA (Espagne)
Tel. : +34 963 483 500

شركة لانتاج سيبكام اينفرا
بروف. بيلتران باغينا، 5-11
46009 فالنسيا (إسبانيا)
الهاتف: 0034963483500

Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du lycée Abdelmoumen
parcelle N°216 B
Actuel J01 local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tel/Fax: 023 70 63 04

مستورد من طرف: ديفاغري ش.ذ.م.م
حي: النابوية عبد المومن
قطعة رقم 216 ب
حاليا ج 01 محل رقم 01
رواية - الجزائر - الجزائر
هاتف/فاكس: 023 70 63 04

Contenu net : 20 L
Date de fabrication : Voir emballage
Date de conservation : 2 ans
Lot de fabrication n° : Voir emballage

المحتوى الصافي: 20 لتر
تاريخ الإنتاج: انظر العلاف
مدة التخزين: سنتان
رقم الدفعة: انظر العلاف

Centre Antipoison d'Alger
Tél: 023 36 77 77
Numéro vert : 1032

مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023367777
الرقم الأخضر: 1032

SIPCAM
INAGRA

20L
20 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE
الرجاء قراءة المصنف بعناية قبل فتح العبوة
AGITER AVANT L'EMPLOI
يرج قبل الاستخدام

الخصائص

أكرويل بلو يعمل بالتلامس، يخترق القنوات الهوائية للحشرات مما يسبب الوفاة بالاختناق.

الاستخدامات الزراعية

يمكن استخدام المنتج عن طريق الرش العادي بالجرار أو يدوياً باستخدام حقبة الظهر أو مسدس الرش.

الزراعات	الجرعة	الآفة	المدة قبل الحصاد
الحماضيات	20 إلى 45 لتر/هكتار	البق الدقيقي	لا ينطبق
الأشجار المثمرة	6 إلى 10 لتر/هكتار	والعنكب	
أشجار الزيتون	7,5 إلى 15 لتر/هكتار	والمن والذبابة	
شجرة الموز	15 إلى 37,5 لتر/هكتار	البيضاء	

نصائح الاستخدام والتوافق

أكرويل بلو يجب استخدامه في الرش العادي على المحصول. لتحضير الخليط، قم بملاء خزان الرش بنصف السعة ومع تشغيل المخلط، أضف المنتج بالتركيز المناسب. ثم، املاً بالماء حتى الكمية الموصى بها، مع التحريك المستمر حتى يتحقق التجانس التام. سيستخدم نجاح المعالجة بشكل أساسي على التوزيع المتساوي على المحصول. لا تُطَبَّر هذا المنتج عند توقع حدوث صقيع أو في الأيام الحارة والجافة. لا يطبق مع المنتجات التي تحتوي على الكابتان، الدينوكاب، الفولبيت، الكبريت أو مع الكلوروثالونيل. من الضروري أن يمر على الأقل 40 يوماً منذ التطبيق مع الكبريت وعلى الأقل 30 يوماً منذ التطبيق مع الكلوروثالونيل والعكس.

تحذيرات واحتياطات

H411: سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

P102: يلزم الحصول على تعليمات خاصة

قبل الاستخدام.

P261: تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/

الضباب/الأبخرة/الرداذ.

P262: يلزم تجنب ملامسة المنتج للعين

أو الجلد أو الملابس.

P273: تجنب انطلاق المادة في البيئة.

P280: تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.

P391: تجمع المواد المنسكبة.

P501: تخلص من المحتويات/الوعاء وفقاً للتشريعات المتعلقة بالنفايات

الخطرة أو تعبئة النفايات والتعبئة.

EUH401: احترم تعليمات الاستخدام لتجنب المخاطر على الصحة البشرية والبيئة.

التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و 40 درجة مئوية، بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

ان التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتاج الدراسات والتجارب المعقدة والدقيقة غير انه العديد من العوامل الخارجية عن التحكم يمكن ان تتدخل اثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس...الخ). وبالتالي فان الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يبقى المسؤول الوحيد عن الاضرار الناتجة (فعالية، تسمم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.