

Curane

ENGRAIS
Poudre Soluble Cristaline (SP)

كوران

سماد
مسحوق بلوري قابل للذوبان (SP)

CONTENU DÉCLARÉ

Anhydride Phosphorique (P_2O_5) 58% p/p
Oxyde de potassium (K_2O) 38% p/p

المحتوى المصريح به

أنهيدريد الفوسفوريك (P_2O_5) 58% وزن/وزن
أكسيد البوتاسيوم (K_2O) 38% وزن/وزن

Fabriqué par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Bagueña, 5-11
46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500
Pays d'origine : Espagne

Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du lycée Abdelmoumen
Parcelle N°216 B Actuel J01
local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tél/Fax : 023.70.63.04



شركة الإنتاج: سيكام اينافرا
بروف. بيلتران باغينا 5-11
46009 فالنسيا (اسبانيا)
الهاتف: 0034963483500
بلد المنشأ: اسبانيا

مستورد من طرف: ديفاجري ش.م.م.
حي الثاويو عبد المومن
قطعة رقم 216 ب حاليا ج 01
محل رقم 01
روبية - الجزائر - الجزائر
رقم الهاتف/الفاكس: 023706304

Contenu net : 1Kg
Date de fabrication : Voir emballage
Date d'expiration : Voir emballage
Lot de fabrication : Voir emballage

Centre Antipoison d'Alger
Tél : 023 36 77 77
Numéro vert : 1032

المقدار الصافي: 1 كيلوغرام
تاريخ الإنتاج: انظر العبوة
تاريخ الانتهاء: انظر العبوة
رقم الدفعة: انظر العبوة

مركز مكافحة السموم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023.36.77.77
الرقم الأخضر: 1032


SIPCAM
INAGRA

ENGRAIS

1Kg 1 كغ

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIER L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العلبة

CARACTÉRISTIQUES

CURANE est une solution d'engrais binaire PK, pour application foliaire ou directement sur les troncs des arbres. Le phosphore sous forme d'ion de phosphite assure une assimilation rapide du potassium qu'il accompagne, ainsi que celle des autres composants de la bouillie.

APPLICATION

Il est recommandé d'appliquer **CURANE** après la saison des pluies, soit au printemps ou en automne, à titre préventif ou lorsqu'on veut faire un traitement revigorant de la plante en périodes difficiles contre les conditions défavorables (humidité, la détérioration des fruits et du bois, etc.). L'application de **CURANE** se traduira par une amélioration de la santé végétale.

CULTURES ET DOSES RECOMMANDÉES

Sur Tomato, Vigne, Pomme de terre, Agrumes, Melons, pommes, Olives, Concombre, Poivrons, Aubergine, Cerise, Chou, Chou-fleur, Tournesol, Céleri, Laitue, Poires, Coton, Ananas, et Tabac entre autres cultures.

Agrumes, fruits et pommes de terre :

Par pulvérisation foliaire : 0,1 % à 0,2 % (100 à 200 g/hl).

Par irrigation par fertilisation : 3 à 6 kg/ha.

Raisin, olive :

Par pulvérisation foliaire : 0,1 % à 0,2 % (100 à 200 g/hl).

Par irrigation par fertilisation : 3,5 à 5 kg/ha (à partir du stade de levée des pousses dans le raisin)

Légumes et fraises :

Par pulvérisation foliaire : 0,1 % à 0,2 % (100 à 200 g/hl).

Par irrigation par fertilisation : 3 à 4 kg/ha.

MODE D'EMPLOI

Il est toujours recommandé de réaliser les applications de **CURANE** de manière préventive. Réaliser deux ou trois applications, selon les besoins de la culture, de préférence par voie foliaire, en mouillant bien la plante.

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS

Ne pas appliquer à hautes températures ($\geq 30^{\circ}\text{C}$). Il peut être mélangé avec la plupart des engrais foliaires et des phytosanitaires. Ne pas mélanger avec des produits riches en calcium, magnésium, huiles, soufre ou des pesticides nitro-dérivés (ex. Dinocap) ni avec plus de deux produits différents, même s'ils sont compatibles. Ne jamais préparer des bouillies d'application avec un pH inférieur à 4 ou supérieur à 10, puisque le produit dans les dites conditions n'est pas stable. En tout cas on recommande d'effectuer un petit test de compatibilité, pour observer la stabilité de la bouillie : laisser reposer pendant au moins deux heures en surveillant son évolution. Maintenir loin des aliments, boissons et aliments pour animaux, ainsi que de la portée des enfants. Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré. Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondies et rigoureuses. Cependant, de nombreux facteurs échappant de notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur serait responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) dus à la non-application entière ou partielle des instructions mentionnés sur l'étiquette.

الخصائص

كوران عبارة عن محلول من الأسمدة الثنائية (الفوسفات والبوتاسيوم) ويستعمل عن طريق الرش على الأوراق أو مباشرة على جذور الأشجار.

التطبيقات

يوصى بتطبيق كوران بعد موسم الأمطار سواء في فصل الربيع أو الخريف بشكل وقائي أو عندما نريد أن نجعله علاجاً منعشاً للنباتات ضد الظروف الغير ملائمة (الرطوبة، تدهور الفواكه...). استعمال كوران يؤدي إلى تحسين صحة النباتات بشكل كبير خاصة في فترات الإزهار، الإثمار وظهور البراعم.

الزراعات ومقادير الاستعمال

الطماطم، العنب، الحوامض، التفاح، البطيخ، الزيتون، البطاطس، الخيار، الاجاص، الفلفل، الأناناس، التبغ، القطن، الكرفس، الباذنجان، الكرّز، الملفوف، القرنبيط، عباد الشمس، الخس، ومجموعة من الزراعات.

الحوامض، الفواكه والبطاطس:

عن طريق الرش الورقي: 0.1 % إلى 0.2 % (100 إلى 200 غرام في الهيكولتر).

عن طريق الري التسميدي: 3-6 كيلوغرام في الهكتار.

الزيتون، العنب:

عن طريق الرش الورقي: 0.1 % إلى 0.2 % (100 إلى 200 غرام في الهيكولتر).

عن طريق الري التسميدي: 3.5 - 5 كيلوغرام في الهكتار (إنطلاقاً من مرحلة ظهور الفسيلة في العنب).

الخضر والفاصولية:

عن طريق الرش الورقي: 0.1 % إلى 0.2 % (100 إلى 200 غرام في الهيكولتر).

عن طريق الري التسميدي: 3 - 4 كيلوغرام في الهكتار.

طريقة استعمال

من المستحسن إجراء عمليات المعالجة بمنتج كوران بطريقة وقائية. إجراء عمليتين أو ثلاث حسب احتياجات الزراعة من الأفضل أن تكون بواسطة الرش على الأوراق مع تبليل النباتات بشكل جيد.

نصائح والقابلية للمزج

لا يستعمل في درجات حرارة عالية (أكثر من أن تساوي 30 درجة). يمكن تخليطه مع معظم الأسمدة الورقية والمبيدات الكيميائية. لا يجب خلطه مع المواد الغنية بالكالسيوم، المغنيزيوم، الزيوت، الكبريت، مبيدات مشتقات النيتريك: مثل دينوكاب. لا يجب خلطه مع أكثر من متوتين مختلفين مهما كانا متوافقين. لا يجب تحضير الخليط مع درجة حموضة أقل من 4 أو أكثر من 10 لتفادي عدم استقرار الخليط. في جميع الأحوال ننصح بإجراء عملية تجريبية للتوافق من أجل ملاحظة استقرار الخليط: يجب ترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل لمراقبة تطوره. يُحفظ بعيداً عن الأطعمة والمشروبات والأعلاف، وكذلك عن متناول الأطفال. يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. تجنب جميع مصادر الحرارة والإشعاع والكهرباء الساكنة وأي اتصال مع الطعام.

تحذير

ان التوصيات والمعلومات التي قدمناها هي ثمرة الدراسة الدقيقة والعديد من التجارب. لكن، خلال استعماله، يمكن ان تحدث العديد من العوامل خارجة عن سيطرتنا (تضخيم الخليط، التطبيق، المناخ، الخ). تضمن الشركة المكونات، الصيغة والمحتوى. يكون المستعمل المسؤول عن كل الخسائر المسببة جراء عدم الاحترام الكلي أو الجزئي لتعليمات المصنع.