

Efficient إفيسيون

Engrais liquide azoté contenant de l'urée
formaldéhyde 28.0.0
Sous forme de Concentré soluble (SL)

سماد سائل بالأزوت يحتوي على
اليوري فورمالدهيد 28.0.0
على شكل سائل مركز

COMPOSITION

Azote (N) total28% p/p
Azote (N) uréique11% p/p
Azote (N) d'urée formaldéhyde17% p/p
Teneur maximale en biuret : inférieure à 0,7%

الأزوت الكامل28% وزن/وزن
الأزوت اليوري11% وزن/وزن
الأزوت اليوري فورمالدهيد17% وزن/وزن
المحتوى الأقصى من اليوري: أقل من 0,7%

التركيبية

Fabriqu  par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltr n B guena, 5-11
46009 Valencia (Espagne)
T l. : +34 963 483 500
Pays d'origine : Espagne

Import  par : **SARL DEVAGRI**
Cit  du lyc e Abdelmoumen
Parcelle N 216 B Actuel J01
local N 01
Rouiba - Alger - Alg rie
T l./Fax : 023706304



شركة الاتاج: سيكام اينافرا
بروف. بيلتران باغينا، 5-11
46009 فالنسيا (اسبانيا)
الهاتف: 0034963483500
بلد المنشأ: اسبانيا

مستورد من طرف: ديفاغري ش.ذ.م.م
سي. اللابونية عبد المؤمن
قطعة رقم 216 ب حاليا ج 01
عقل رقم 01
وعدة الجزائر - الجزائر
رقم الهاتف الفاكسي: 023706304

Contenu net : 5 L
Dur e de conservation : 3 ans
Date de fabrication : Voir emballage
N  Lot : Voir emballage
المقدار الصافي لـ
تاريخ الاتاج: انظر العبوة
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: انظر العبوة
Centre Antipoison d'Alger
T l : 023367777
Num ro vert : 1032

مركز مكافحة السمسم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023367777
الرقم الاخضر: 1032



ENGRAIS



5L
5 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L' TIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح الغلاف

AGITER AVANT L'EMPLOI

يرج قبل الاستخدام

CARACTÉRISTIQUES

Efficient est un engrais azoté très efficace et persistant, qui offre deux types d'azote : l'azote uréique pour une action rapide, et l'urée-formaldéhyde pour une libération progressive de l'azote, assurant ainsi une nutrition continue des cultures.

Conçu pour une fertilisation foliaire optimale, **Efficient** est respectueux de l'environnement. Il pénètre rapidement dans les feuilles, résiste au lessivage, réduit les pertes d'azote dues à la pluie ou à l'humidité élevée, et garantit une disponibilité de l'azote pendant 8 à 10 semaines.

Utilisé en tant qu'amendement du sol, il diffuse l'azote sur une période de 100 jours, enrichissant les 10 à 15 premiers centimètres du sol et se convertissant en nitrate facilement absorbable par les cultures. De plus, il est compatible avec les mélanges herbicides.

USAGE AGRICOLE

CULTURE	DOSE		ÉPOQUE ou MODALITÉ D'USAGE
	L/ha	Kg/ha	
Vigne	5-10	6-12	Post-floraison
Agrumes	5-10	6-12	Différentiation florale et après la nouaison
Olivier	5-10	6-12	Debut avant la floraison et répéter tous les 30 jours
Arbres fruitiers	5-10	6-12	Debut avant la floraison, nouaison du fruit et répéter tous les 30 jours
Cultures maraichères	5-10	6-12	Avant la floraison et applications tous les 10-14 jours
Légumes à feuilles	5-8	6-10	À la formation du bourgeon et répéter tous les 14 jours
Fraise	5-10	6-12	Début de la floraison et répéter tous les 15 jours
Gazon	15-24	19-30	Applications tous les 50-60 jours
Céréales	10-25	12-31	1 ^{er} traitement entre la première multiplication des épis jusqu'au premier nœud 2 ^{ème} traitement entre la dernière feuille/floraison
Mais	10-15	12-19	Post levée précoce et traitement acaricide
Soja	4-8	5-10	Stade R2-R3 (R2 : floraison complète - R3 : début de la formation gousses)
Coton	5-8	6-10	Stade de 4 feuilles, après la floraison et pendant la formation de la capsule

Remplir le réservoir à moitié avec de l'eau, ajouter la quantité requise d'**Efficient** à l'aide de l'agitateur. Ajouter les produits phytosanitaires si nécessaire, tout en maintenant l'agitation, puis appliquer. Les doses peuvent être modifiées en fonction du potentiel productif de la culture et des conditions agronomiques d'utilisation.

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS

Efficient peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires du marché. Ne pas utiliser en mélange avec le tébuconazole sur les cultures de céréales d'hiver à des températures supérieures à 25°C. Il n'est pas compatible avec les produits très acides ni avec les solutions contenant du nitrate d'ammonium. Il est conseillé de faire un mélange préalable pour vérifier la compatibilité. Avec des eaux dures, il est recommandé de maintenir un pH proche de la neutralité. Il est incompatible avec certains produits tels que les acides phosphoriques, nitrique et sulfurique, les phosphates monoammonique et monopotassique, et le sulfate d'ammonium. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant son acquisition.

Stockage : Ne pas stocker le produit à des températures inférieures à -5°C ni supérieures à 30°C. Éviter les changements brusques de température. Garder le produit dans son contenant d'origine fermé jusqu'à son utilisation.
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P404 : Stocker dans un récipient fermé.
EUH208 : Contient Formaldéhyde. Peut produire une réaction allergique.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondies et rigoureuses. Cependant, de nombreux facteurs échappant de notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur serait responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) dus à la non-application entière ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.

الخصائص

إفيسون هو سماد نيتروجيني فعال للغاية ومستمر، يوفر نوعين من النيتروجين: نيتروجين البوريا لتأثير سريع، والبوريا-فورمالدهيد لتحرير متدرج للنيتروجين، مما يضمن تغذية مستمرة للمحاصيل.

تم تصميم **إفيسون** لتحسين التسميد الورقي، واحترام البيئة. يخترق **إفيسون** بسرعة أوراق النباتات، ويقاوم الغسيل، ويقلل من فقدان النيتروجين الناتج عن الأمطار أو الرطوبة العالية، ويضمن توافر النيتروجين لمدة 8 إلى 10 أسابيع.

عند استخدامه في التربة، ينتشر النيتروجين على مدى 100 يوم، مغذيًا الطبقة الأولى من التربة بمقدار 10 إلى 15 سنتيمترًا، ويتحول إلى نترات يمكن امتصاصها بسهولة من قبل المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه متوافق مع مخلفات المبيدات العشبية.

الاستخدامات الزراعية

الزراعة	الجرعة		الفترة أو طريقة الاستعمال
	ك/هكتار	ل/هكتار	
العنب	10-5	12-6	بعد التزهير
الحوامض	10-5	12-6	أثناء التفريق الزهري وفتح الأزهار
الزيتون	10-5	12-6	قبل الإزهار مع إعادة التطبيق كل 30 يوم
الأشجار المثمرة	10-5	12-6	قبل الإزهار وتشكل الفاكهة مع إعادة التطبيق كل 30 يوم
الخضراوات	10-5	12-6	قبل الإزهار مع إعادة التطبيق كل 14 إلى 10 يوم
الخضراوات الورقية	8-5	10-6	عند تكون البرعم مع إعادة التطبيق كل 14 يوم
الفراولة	10-5	12-6	بداية الإزهار مع إعادة التطبيق كل 15 يوم
عشب أخضر	24-15	30-19	تطبيق كل 50 إلى 60 يوم
الحبوب	25-10	31-12	العلاج الأول: بين تضاعف أول خلفة حتى ظهور العقدة الأولى العلاج الثاني: بين آخر ورقة والتزهير
الدرة	15-10	19-12	النشوء المبكر واستعمال مبيد القراويات
الصويا	8-4	10-5	انتهاء الإزهار الكامل وبداية تكوين القرن
القطن	8-5	10-6	عند بداية 4 ورقات، بعد التزهير وأثناء تكون العلبة

أما الخزان حتى منتصفه بالماء، أضف الكمية المطلوبة من **إفيسون** باستخدام المحرك. أضف المنتج الكيميائي الزراعي إذا لزم الأمر، مع الحفاظ على التحريك، ثم قم بالتطبيق. يمكن تعديل الجرعات بناءً على القدرة الإنتاجية للمحصول وظروف الاستخدام الزراعية.

احتياطات و نصائح

يمكن خلط **إفيسون** مع معظم المنتجات الكيميائية الزراعية في السوق. لا تستخدمه في الخليط مع البيوكونازول أو في محاصيل الحبوب الشتوية عند درجات حرارة تتجاوز 25 درجة مئوية. إنه غير متوافق مع المنتجات شديدة الحموضة ولا مع المحاليل التي تحتوي على نترات الأمونيوم. يُنصح بإجراء خلط مسبق للتحقق من التوافق. مع المياه الثقيلة، يوصى بالحفاظ على درجة حموضة قريبة من الحياد. إنه غير متوافق مع بعض المنتجات مثل الأحماض الفوسفورية، النيتريك، الكبريتيك، الفوسفات أحادي الأمونيوم وأحادي البوتاسيوم، وكبريتات الأمونيوم. يوصى باستخدام المنتج خلال 12 شهرًا من تاريخ شرائه.

التخزين: لا تقم بتخزين المنتج في درجات حرارة أقل من -5 درجة مئوية أو أعلى من 30 درجة مئوية. تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. احتفظ بالمنتج في وعائه الأصلي المغلق حتى استخدامه.
P102: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
P270: ممنوع تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج.
P404: يحزن في وعاء مغلق.
EUH208: يحتوي على الفورمالدهيد. قد يسبب تفاعلاً تحسسياً.

تحذير

إن التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتاج الدراسات والتجارب المدعومة والدقيقة غير أنه العديد من العوامل الخارجية عن التحكم يمكن أن تتدخل أثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس، الخ...) وبالتالي فإن الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يتبنى المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة (فعالية، تسمم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.