

CARACTÉRISTIQUES

Inabor® est un correcteur de carence en bore (B), un micronutriment essentiel au développement végétatif des plantes, qui intervient dans les processus de nouaison donnant la viabilité aux grains de pollen (maturation, amélioration de la taille, fertilité des grains de pollen, croissance des tubes polliniques). Il facilite la transformation des sucres par la plante, intervient dans la formation de la paroi cellulaire, en améliorant l'absorption d'eau et règle le rapport potassium-calcium, augmentant ainsi la taille et la qualité des fruits et légumes traités, réduisant des problèmes de fissuration ou de « éclatement » des fruits. Il favorise la croissance et le développement des racines grâce à la production d'hormones impliquées dans ce processus. **Inabor®** par son absorption rapide, corrige le manque de bore dans les tissus jeunes (pousses et feuilles), évitant ainsi leur atrophie et leur déformation.

USAGES AGRICOLES

Culture	Dose	Mode d'emploi
Pommier, Poirier Prunier, Cerise	1-2 l/ha 1 l/ha	L'état de bouton rose début de floraison et se répète à la chute des pétales la première dose pour pommier et la deuxième pour poirier. Et pour prunier et cerisier la dose est de 1-2 l/ha au stade bourgeon d'hiver en répétant l'application au stade bouton rose. Appliquer 2 l/ha après récolte mais toujours avant la chute des feuilles. Volume d'eau : 500-100 l/ha pour tous les arbres.
Olivier	200-300 ml/ha	Appliquer avant la floraison à un volume de bouillon compris entre 600 et 800 l/ha.
Fraisier	1 l/ha	2 applications, la première en bouton vert et répéter l'application après 10-14 jours. Volume d'eau : 200 l/ha
Laitue	1 à 2 l/ha	-
Brocoli, Chou-fleur, Chou, Carotte, Navet	3 l/ha	-
Oignon	1 l/ha	-
Haricot et pois	2 l/ha	Lorsque la plante mesure 10-15 cm pour les carences modérées à sévères, répéter l'application après 10-14 jours. Volume d'eau : 200 l/ha.
Colza	3 l/ha	Pour une seule application utiliser 3 l/ha en début de croissance des tiges, pour les carences modérées, appliquer 3 l/ha à l'état de 4 à 6 filles et 3 l/ha en début de croissance des tiges, volume d'eau : 200 l/ha.
Mais	3 l/ha	À l'état de 6-8 feuilles, pour les carences modérées à sévères, répéter l'application si nécessaire, après 10-14 jours. Volume d'eau : 200 l/ha.
Pomme de terre	1 l/ha	Une application de 1 l/ha appliquer une semaine après 100% de levée. Une deuxième application peut être faite après 10-14 jours. Appliquer également 1 l/ha après analyse des pétioles, lors de l'engraissement des tubercules.
Vigne	1 l/ha	10-14 jours avant la floraison, au début de floraison et après floraison. 3 candidatures au total.
Lentille	1-1.5 l/ha	A l'ouverture des premières fleurs et répéter le traitement tous les 8-10 jours, 2-3 applications au total.
Betteraves à sucre et de table	3 l/ha	Au stade 4-6 feuilles, pour les carences modérées à sévères, répéter les traitements si nécessaire, avec un intervalle de 10-14 jours. Volume d'eau : 200 l/ha.
Application au sol	5 l/ha	En pré-plantation ou pré-lévee avec suffisamment d'eau pour assurer une application correcte.

CONSEILS D'EMPLOI

Agitez avant emploi. Le produit doit être utilisé en pulvérisation normale sur la culture, en ajoutant 50% d'eau dans le réservoir de pulvérisation et endossant la quantité appropriée de produit, en remuant continuellement jusqu'à son homogénéisation parfaite. Après ça, remplites complètement le réservoir. Agitez pendant quelques minutes avant de commencer le traitement. Ne pas appliquer avec de hautes températures (> 30°C), sécheresse, humidité élevée, gel, etc. Il peut être mélangé avec la plupart des pesticides et engrais foliaires.

PRÉCAUTIONS

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Stockage : Stocker le produit dans un endroit frais et ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le résultat de nombreuses études et essais rigoureux. Cependant, lors de son utilisation, peuvent intervenir de nombreux facteurs hors de notre contrôle (préparation de mélanges, application, climatologie, etc.). La société garantit la composition, formulation et contenu. L'utilisateur sera responsable des dégâts causés (manque d'efficacité, toxicité en général, déchets, etc) non-respect total ou partiel des instructions de l'étiquette.



Correcteur de carence
Liquide (SL)

صحح النقص
سائل (SL)

CONTENU DECLARÉ

المحتوى المصرح به

Bore..... 11% p/p

بورون..... 11% وزن/وزن

N° CHPPUA : 24 67 07

رحمة البيع:

شركة الإنتاج: سيكام اينابور
Prof. Beltrán Baquena, S+I
46009 Valencia (Espagne)
الهاتف: 0034963483500
بلد المنشأ: إسبانيا
مستورد من طرف: د. طارق ش. د.م.م
جهة التوزيع: مركز التسميد
فصل رقم 216 ب حاليا ج 01
محل رقم 01
رومية - الجزائر
Rouiba - Alger - Algérie
Tél. / Fax : 023 70 63 04
Contenu net : 1L
Date de fabrication : voir emballage
Durée de conservation : 3 ans
Lot de fabrication n° : voir emballage
Centre Antipoisson d'Alger
Tél. : 023 96 77 77
Numéro vert : 1032



CORRECTEUR DE CARENCE



LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

الخصائص

اينابور هو صحح لنقص البورون (ب)، أحد العناصر المغذية الدقيقة الأساسية للنمو النباتي، ويشارك في مرحلة عقد الفاكهة التي تمنح حبوب اللقاح قابلية الحياة (النضج، ونحسين حجمها، خضوبة حبوب اللقاح، وغو أنابيب اللقاح)، يسهل تحول السكريات من قبل النبات، ويلعب دوراً في تكوين جدار الخلية عن طريق تحسين امتصاص الماء وتنظيم نسبة البوتاسيوم والكالسيوم، وبالتالي يزيد من حجم وجود الفاكهة والخضروات المعالجة، مما يقلل من الشقوق. كما أنه يعزز نمو الجذور وتطورها من خلال إنتاج الهرمونات المشاركة في هذه العملية، ويفضل امتصاصه السريع، يعمل على تصحيح نقص البورون في الأنسجة النضجة (البراعم والأوراق)، مما يمنعها من الصمود والتشوه.

الاستخدامات والجرعة الموصى بها

المحاصيل	الجرعة	تعليمات الاستخدام
تفاح، كمثرى برقوق، كرز	2-1 لتر/هكتار 1 لتر/هكتار	الجرعة الأولى عند سقوط البتلة للنضج والثانية في مرحلة البراعم الوردية في بداية الإزهار وتكرار والبلوغ بالنسبة لأشجار البرقوق والكرز، تكون الجرعة 2-1 لتر/هكتار في مرحلة البراعم الشوية، مع تكرار الاستخدام في مرحلة البراعم الوردية. تطبيق 2 لتر/هكتار بعد الحصاد ولكن دائماً قبل سقوط الأوراق. حجم الماء: 500-100 لتر/هكتار لجميع الأشجار.
زيتون	300/200 مل/هكتار	يتم تطبيقه قبل الإزهار بكمية من السماد المختلط تتراوح بين 600 إلى 800 لتر/هكتار.
فراولة	1 لتر/هكتار	تطبيقات، الأولى عند الطوف الأخضر والثانية بعد 14-10 يوماً. حجم الماء: 200 لتر/هكتار.
خس	2-1 لتر/هكتار	-
البروكلي والقرنبيط والملفوف والجزر والثفت	3 لتر/هكتار	-
بصل	1 لتر/هكتار	-
القاصوليا والبازلاء	2 لتر/هكتار	عندما يبلغ طول النبات من 10-15 سم للنقص المعتدل إلى الشديد، كرر الاستخدام بعد 14-10 يوماً. حجم الماء: 200 لتر/هكتار.
الثفل الزيتي	3 لتر/هكتار	بالنسبة للاستخدام الواحد، استخدم 3 لتر/هكتار في بداية نمو الجذع؛ أما بالنسبة للنقص المعتدل، استخدم 3 لتر/هكتار عند 4 إلى 6 نبات و3 لتر/هكتار عند بداية نمو الجذع؛ حجم الماء: 200 لتر/هكتار.
ذرة	3 لتر/هكتار	في مرحلة 6-8 أوراق، بالنسبة لحالات نقص المعتدلة إلى الشديدة، كرر الاستخدام إذا لزم الأمر بعد 14-10 يوماً. حجم الماء: 200 لتر/هكتار.
بطاطس	1 لتر/هكتار	تطبيق معدل 1 لتر/هكتار بعد أسبوع من الانبات بنسبة 100%؛ يمكن إجراء تطبيق ثاني بعد 14-10 يوماً. تطبيق أيضاً معدل 1 لتر/هكتار بعد تحليل أعناق الأوراق أثناء تسمين الدرنات.
عنب	1 لتر/هكتار	14-10 يوماً قبل الإزهار، وفي بداية الإزهار وبعد الإزهار. 3 تطبيقات في المجموع.
عندس	1.5-1 لتر/هكتار	عند تفتح الأزهار الأولى وتكرار العلاج كل 8-10 أيام، 3-2 استخدامات في المجموع.
بنجر السكر وبنجر المائدة	3 لتر/هكتار	في مرحلة 6-4 أوراق، بالنسبة لحالات نقص المعتدلة إلى الشديدة، كرر المعالجة إذا لزم الأمر، على فترات تتراوح بين 10 و14 يوماً. حجم الماء: 200 لتر/هكتار.
تطبيق أرضي	5 لتر/هكتار	قبل الغرس أو ما قبل الظهور ماء كافي لضمان الاستخدام الصحيح.

توصيات الاستخدام

رج العبو جيداً قبل الاستعمال. يجب استخدام المنتج عن طريق الرش العادي على المحصول، مع إضافة 50% من الماء في خزان الرش وإضافة الكمية المناسبة من المنتج، مع التحريك المستمر حتى يتم التجانس التام. بعد ذلك، يجب ملء الخزان بالكامل. تحريك الخليط لبضع دقائق قبل بدء المعالجة. لا يطق المنتج في درجات حرارة مرتفعة (أكثر من 30 درجة مئوية)، أو في حالات الجفاف، أو الرطوبة العالية، أو الصقيع، وما إلى ذلك. يمكن خلطه مع معظم المبيدات والأسمدة الوردية.

الاحتياطات

P102: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P270: تمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء التعامل مع هذا المنتج.

التخزين: يُخزن المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و 40 درجة مئوية، وبعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي تقدمها هي نتيجة الأبحاث واختبارات مكثفة وصارمة . ومع ذلك ، قد تحدث العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا أثناء الاستخدام (تضخم الخللاط، والتطبيق ، وعامل المناخ ، وما إلى ذلك) . تضمن الشركة التكوين والتصاغة والمحتوى . سيكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (التعالية ، السمية بشكل عام ، الثفائات، إلخ) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي لتعليمات الملصق.