

Liqui-K Express

لكي-ك إكسبريس

Engrais Minéral composé pour application foliaire et fertirrigation
Poudre soluble dans l'eau (SP)

سماد معدني يستعمل عن طريق الرش الورقي والتسميد مسحوق قابل للذوبان في الماء

CONTENU DÉCLARÉ

Azote total (N) – sous forme uréique, soluble dans l'eau 3% (p/p)
Oxyde de potassium (K₂O) - soluble dans l'eau 50% (p/p)

نيتروجين كامل (N) - على شكل اليوريا، قابل للذوبان في الماء 3% (و/و)
أكسيد البوتاسيوم (K₂O) - قابل للذوبان في الماء 50% (و/و)

Fabriqué par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Báguena, 5 – 11
E-46009 Valencia (Espagne)
Tél.: +34 963 483 500
Pays d'origine : Espagne

Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du lycée Abdelmoumen
parcelle N°216 B Actuel JO1 local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tél.Fax : 023 70 63 04

Centre Antipoison d'Alger
Tél : 023 36 77 77
Numéro vert : 1032



شركة الإنتاج: سيبكام اينغرا
بروف، بلتران باغينا، 11-5
46009 فالنسيا (اسبانيا)
الهاتف: 0034963483500
بلد المنشأ: اسبانيا
مستورد من طرف: ديفاغري ش.ذ.م.م
حي الثنوية عبد المومن قطعة رقم 216 ب
حاليا ج 01 محل رقم 01
رويبة - الجزائر - الجزائر
هاتف فاكس: 023 70 63 04
مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023367777
الرقم الأخضر: 1032

Contenu net : 5 kg
Date de Fabrication :
Voir emballage
Date de conservation : 3 ans
Lot de Fabrication N°:
Voir emballage

المحتوى الصافي: 5 كيلوغرام
تاريخ الإنتاج: انظر الغلاف
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: انظر الغلاف

5Kg
5 كغ

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

CARACTÉRISTIQUES

LIQUI-K EXPRESS apporte un potassium hautement disponible et rapidement assimilable, améliorant le développement, la maturation et la résistance des cultures face aux conditions défavorables.

DOSES ET MODES D'EMPLOI

CULTURES ET OBJECTIFS	MOMENT D'APPLICATION	DOSE	PULVÉRISATION	DOSE
Fruitiers à noyau : - Maturité précoce. - Amélioration de la coloration. - Plus grands calibres.	Entre l'éclosion des fruits et l'endurcissement du noyau. Fractionner la dose. Lors du développement du fruit (pendant les 30 jours avant la récolte). Fractionner cette dose. Doses pour des arbres en pleine production.	60 g/litre 100 g/litre	A partir de l'endurcissement du noyau du fruit jusqu'à 7 jours avant la récolte.	2- 200-300 g/l (0.2-0.3%) 3- 200-300 g/l (0.2-0.3%)
Fruitiers à pépins : - Plus grands calibres. - Plus grande durée. - Amélioration de la coloration.	- Depuis le début de la pousse jusqu'au début de la chute des pétales. A partir de la chute des pétales, jusqu'à une semaine avant la récolte. Fractionner cette dose. Doses pour des arbres en pleine production.	60 g/litre 100 g/litre	A partir du début de la croissance du fruit jusqu'à 30 jours avant la récolte.	2- 200-300 g/l (0.2-0.3%) 3- 200-300 g/l (0.2-0.3%)
Agrumes : - Amélioration nette de la coloration. - Maturité précoce. - Idéal pour appliquer avec les produits pour le grossissement	Fractionner la dose en 1-2 passages, chaque semaine, pendant les 30-45 jours avant la récolte. Commencer par les fruits les plus faibles pour les augmenter au fur et à mesure que la récolte s'approche. Réserver les doses les plus élevées pour les 3 dernières semaines avant la récolte. Autres jeunes: - Arbres adultes	20-50 g/litre 25-100 g/litre	Avec les traitements pour le grossissement. Approximativement 15 jours à un mois avant le changement de la couleur.	2- 200-300 g/l (0.2-0.3%) 3- 200-300 g/l (0.2-0.3%)
Vigne et treilles : - Augmente le BRIX. - Grossit les baies.	Fractionner la dose en plusieurs passages entre le changement de couleur et la maturité.	25-50 g/litre	1 ^{er} traitement au changement de couleur. 2 nd traitement 20 jours après le premier. 3 rd traitement 3 semaines avant la récolte.	3- 3-4 kg/ha
Olivier : - Augmente la production. - Améliore le rendement gras commercial. - Augmente la résistance au froid et à la sécheresse.	- En automne : En printemps, si la récolte précédente a été abondante, compléter avec un 30% de plus.	10-15 kg/ha 3-5 kg/ha	1 ^{er} traitement en printemps. 2 nd traitement en automne.	2- 300-400 g/l (0.3-0.4%) 3- 300-400 g/l (0.3-0.4%)
Tomate, Poivron, Aubergine : - Augmente la production. - Augmente le poids et le calibre des fruits. - Accélère le changement de couleur. - Regroupe la production.	Commencer les applications 1-2 semaines avant la date théorique de la récolte, en les répétant tous les 5-10 jours.	7-15 kg/ha	Commencer une semaine avant la date théorique de la récolte que l'on veut faire. Répéter chaque fois que nécessaire pour forcer la maturité.	4- 300 g/l (0.3%)
Melon, Pastèque : - Avance la récolte. - Augmente le degré en sucre.	Appliquer 2-3 applications en commençant lorsque les fruits atteignent le calibre commercial souhaité.	7-15 kg/ha	1 ^{re} application pendant la floraison. 2 nd application une semaine avant la première coupe. 3 rd 10 jours après.	2- 300-400 g/l (0.3-0.4%) 3- 300-400 g/l (0.3-0.4%)
Pomme de terre : - Grossissement des tubercules. - Uniformité du calibre des tubercules.	Applique 3-4 semaines avant la récolte.	10-20 kg/ha	Commencer les applications au début de la formation des tubercules et répéter toutes les 2-3 semaines.	2- 300-400 g/l (0.3-0.4%) 3- 300-400 g/l (0.3-0.4%)

(*) Pour une consommation estimée de 700-800 litres de brouille par hectare (ha).

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H318 : Provoque de graves lésions des yeux. H315 : Provoque une irritation cutanée. H335 : Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection des vêtements de protection/protection respiratoire/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et/ou son récipient à travers le système de collecte sélective utilisé dans votre commune. Substances qui contribuent à la classification. Sulfate de potassium (10 % < KHSO4 < 15 %) (CAS : 7778-80-5); carbonate de potassium (CAS : 584-08-7); éthylène diamine tétraacétate de tétrasodium (CAS : 64-02-8).
Stockage : Conserver le produit dans un endroit frais et bien ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

الخصائص
يوفر لكي-ك إكسبريس البوتاسيوم بدرجة عالية من التوافر وسرعة الامتصاص، مما يحسن نمو المحاصيل ونضجها ويعزز مقاومتها للظروف غير المواتية.

طريقة الاستعمال والجراجات اللازمة

المحصول والهدف	وقت التطبيق	عن طريق الرش	عن طريق الري
فواكه ذات النواة:			عدد الجرات
- التفاح المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- التفاح المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- التفاح المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
فواكه ذات النواة:			عدد الجرات
- التفاح المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- التفاح المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- التفاح المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
فواكه حشيشية:			عدد الجرات
- التفاح المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- التفاح المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- التفاح المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الكروم والعنب:			عدد الجرات
- الكروم المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الكروم المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الكروم المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
- الزيتون المتأخر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	100 g/litre	2
الزيتون:			عدد الجرات
- الزيتون المبكر.	من بداية الصيف حتى بداية سقوط البتلات.	60 g/litre	2
- الزيتون المتأخر			