CARACTÉRISTIQUES

Alfabore Speed est un correcteur de carence en bore (B), un micronutriment essentiel au développement végétatif des plantes, qui intervient dans les processus de nouaison donnant la viabilité aux grains de pollen (maturation, amélioration de la taille, fertilité des grains de pollen, croissance des tubes polliniques). Il facilite la transformation des sucres par la plante, intervient dans la formation de la paroi cellulaire, en améliorant l'absorption d'eau et régule le rapport potassium-calcium, augmentant ainsi la taille et la qualité des fruits et légumes traités, réduisant des problèmes de fissuration ou d'« éclatement » des fruits. Il favorise la croissance et le développement des racines grâce à la production d'hormones impliquées dans ce processus. **Alfabore Speed** par son absorption rapide, corrige le manque de bore dans les tissus jeunes (pousses et feuilles), évitant ainsi leur atrophie et leur déformation.

USAGES AGRICOLES

Culture	Doses et Mode d'Emploi
Cultures maraîchères	Appliquer avant la floraison à une dose de 1 à 2 l/ha. Répéter l'application avant chaque floraison si nécessaire.
Arbres Fruitiers	1 à 2 l/ha au stade floraison et répéter l'application à la chute des pétales. Appliquer 2 l/ha après la récolte, mais toujours avant la chute des feuilles.
Olivier	Appliquer avant la floraison à une dose de 100 - 200 cc/hl.
Pommier	1 à 2 l/ha au stade du bouton rose, au début de la floraison et répéter l'application à la chute des pétales.
Tomate	Appliquer avant la floraison à une dose de 1 à 2 l/ha. A répéter avant chaque floraison.
Fraisier	2 applications de 1 l/ha, la première sur le bouton vert et répéter l'application après 10-14 jours. Appliquer également 2 l/ha après la récolte, lorsqu'il y a de nouvelles pousses.
Haricots et Pois	2 l/ha lorsque la plante a une hauteur de 10-15 cm. En cas de carences modérées à sévères, répéter l'application après 10-14 jours.
Maïs	2 l/ha au stade 6-8 feuilles. En cas de carences modérées à sévères, répéter l'application, si nécessaire, après 10-14 jours.
Pomme de terre	Une application de 1 à 2 l/ha, une semaine après l'émergence de 100 %. Une deuxième application peut être faite après 10-14 jours. Appliquer également 1 l/ha après l'analyse des pétioles, pendant l'engraissement des tubercules.
Vigne	10-14 jours avant la floraison, au début de la floraison et après la floraison. Dose : 1 à 2 l/ha.
Betterave à sucre	2 l/ha au stade 4-6 feuilles, pour des carences modérées à sévères, répéter les traitements, si nécessaire, avec un intervalle de 10-14 jours. Volume d'eau : 200 l/ha.

CONSEILS D'EMPLOI

Agitez avant emplot. Le produit doit être utilisé en pulvérisation normale sur la culture, en ajoutant 50% d'eau dans le réservoir de pulvérisation et endossant la quantité appropriée de produit, en remuant continuellement jusqu'à son homogénéisation parfaite. Après ça, remplissez complètement le réservoir. Agitez pendant quelques minutes avant de commencer le traitement. Ne pas appliquer avec de hautes températures (> 30ºC), sécheresse, humidité élevée, gel, etc. Il peut être mélangé avec la plupart des pesticides et engrais foliaires.

PRÉCAUTIONS

P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Stockage : Stocker le produit dans un endroit frais et ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le résultat de nombreuses études et essais rigoureux. Cependant, lors de son utilisation, peuvent intervenir de nombreux facteurs hors de notre contrôle (préparation de mélanges, application, climatologie, etc). La société garantit la composition, formulation et contenu. L'utilisateur sera responsable des dégâts causés (manque d'efficacité, toxicité en général, déchets, etc) non-respect total ou partiel des instructions de l'étiquette.

Alfabore Speed

ألفابور سبيد

Correcteur de carence
Liquide (SL)

مصحح النقص
سائل (SL)

CONTENU DECLARÉ — المحتوى المصرح به

Bore..... 11% p/p

بورون..... 11٪ وزن/وزن

Fournisseur : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Báguena, 5 - II
E-46009 Valencia - Espagne
Tél. : +34 963 483 500

Importé et Distribué par : **ALFACHIMIE**
Lotissement Bouskoura Park,
Lot 19 Ville Verte
20180 Bouskoura, Casablanca
Tél : (+212) 0675000-(+212) 05 22321311
Fax : (+212) 0522321293

Contenu net : 1L
Date de fabrication : voir emballage
Lot de fabrication n° : voir emballage

ALFACHIMIE

المقدار الصافي: 1 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
رقم الدفعة: أنظر العبوة

SIPCAM INAGRA

CORRECTEUR DE CARENCE







1 L

1 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

الخصائص

ألفابور سبيد هو مصحح لنقص البورون (ب)، أحد العناصر المغذية الدقيقة الأساسية للنمو النباتي. ويشارك في مرحلة عقد الفاكهة التي تمنح حبوب اللقاح قابلية الحياة (النضج، وتحسين حجمها، خصوبة حبوب اللقاح، ونمو أنابيب اللقاح). يسهل تحول السكريات من قبل النبات، ويلعب دورًا في تكوين جدار الخلية عن طريق تحسين امتصاص الماء وتنظيم نسبة البوتاسيوم والكالسيوم، وبالتالي يزيد من حجم وجودة الفاكهة والخضروات المعالجة، مما يقلل من التشققات. كما أنه يعزز نمو الجذور وتطورها من خلال إنتاج الهرمونات المشاركة في هذه العملية. بفضل **ألفابور سبيد** امتصاصه السريع، يعمل على تصحيح نقص البورون في الأنسجة الفتية (البراعم والأوراق)، مما يمنعها من الضمور والتشوه.

الاستخدامات والجرعة الموصى بها

الزراعات	الجرعات وطريقة الاستعمال
الخضروات	يُطبّق قبل مرحلة الإزهار بمعدل 1 إلى 2 لتر/هكتار. تُكرّر المعاملة قبل كل إزهار عند الضرورة.
الأشجار المثمرة	يُطبّق بمعدل 1 إلى 2 لتر/هكتار في مرحلة الإزهار، وتُعاد المعاملة عند تساقط البتلات. تطبيق 2 لتر/هكتار بعد الحصاد، ولكن دائمًا قبل تساقط الأوراق.
الزيتون	يُطبّق قبل الإزهار بمعدل 100–200 سم³/هكتولتر.
التفاح	يُطبّق بمعدل 1 إلى 2 لتر/هكتار في مرحلة التبرعم الوردي، وعند بداية الإزهار، وتُعاد المعاملة عند تساقط البتلات.
الطماطم	يُطبّق قبل الإزهار بمعدل 1 إلى 2 لتر/هكتار، وتُكرّر المعاملة قبل كل إزهار.
الفراولة	معاملتان بمعدل 1 لتر/هكتار لكل منهما؛ الأولى عند مرحلة البراعم الخضراء، وتُعاد المعاملة بعد 10–14 يومًا. تطبيق 2 لتر/هكتار أيضًا بعد الحصاد، عند ظهور براعم جديدة.
الفاصولياء والبازلاء	يُطبّق بمعدل 2 لتر/هكتار عندما يبلغ ارتفاع النبات 10–15 سم. وفي حالات النقص الغذائي المتوسط إلى الشديد، تُعاد المعاملة بعد 10–14 يومًا. الفاصولياء والبازلاء.
الذرة	يُطبّق بمعدل 2 لتر/هكتار في مرحلة 6–8 أوراق. وفي حال ظهور أعراض نقص غذائي متوسط إلى شديد، تُعاد المعاملة عند الضرورة بعد 10–14 يومًا.
البطاطس	معاملة واحدة بمعدل 1 إلى 2 لتر/هكتار بعد أسبوع من اكتمال الإنبات (100%). يمكن إجراء معاملة ثانية بعد 10–14 يومًا. كما يُطبّق 1 لتر/هكتار بعد تحليل أعناق الأوراق أثناء مرحلة تضخّم الدرنات.
العنب	يُطبّق قبل الإزهار بـ 10–14 يومًا. وعند بداية الإزهار، وبعد انتهاء الإزهار. الجرعة: 1 إلى 2 لتر/هكتار.
الشمندر السكري	يُطبّق بمعدل 2 لتر/هكتار في مرحلة 4–6 أوراق. وفي حالات النقص الغذائي المتوسط إلى الشديد، تُكرّر المعاملة عند الضرورة بفاصل 10–14 يومًا. ويُعتمد حجم ماء رش مقداره 200 لتر/هكتار.

توصيات الاستخدام

رج العبوة جيدًا قبل الاستعمال. يجب استخدام المنتج عن طريق الرش العادي على المحصول، مع إضافة 50٪ من الماء في خزان الرش وإضافة الكمية المناسبة من المنتج، مع التحريك المستمر حتى يتم التجانس التام. بعد ذلك، يجب املاء الخزان بالكامل. تحريك الخليط لبضع دقائق قبل بدء المعالجة. لا يطبق المنتج في درجات حرارة مرتفعة (أكثر من 30 درجة مئوية)، أو في حالات الجفاف، أو الرطوبة العالية، أو الصقيع، وما إلى ذلك. يمكن خلطه مع معظم المبيدات والأسمدة الورقية.

الاحتياطات

P102: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

P270: يُمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء التعامل مع هذا المنتج.

التخزين: يُخزن المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و 40 درجة مئوية، وبعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة لأبحاث واختبارات مكثفة وصارمة . ومع ذلك ، قد تحدث العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا أثناء الاستخدام (تحضير الخلائط ، والتطبيق ، وعامل المناخ ، وما إلى ذلك) . تضمن الشركة التكوين والصياغة والمحتوى . سيكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (الفعالية ، السمية بشكل عام ، النفايات، إلخ) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي لتعليمات الملصق.

SPECIMEN