Ayron إيرون

CHÉLATE DE FER Micro-granulé (MG)

CORRECTEUR





COMPOSITION

Fer (Fe) total soluble dans l'eau 6%
Fer (Fe) chélaté EDDHA (ortho-ortho) 4,8%

Contenu net : 1 Kg
Date de fabrication : voir emballage
Durée de conservation : 3 ans
Lot de fabrication N° : voir emballage

المقدار الصافي: 1 كيلوغرام
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Firme et fabrication : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Báguena, 5-11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Importateur : **SIPCAMINAGRA MAROC SARL AU**
N° 260 Route 206 Quartier Industriel
KENITRA (Maroc)

Distributeur exclusif au Maroc : **AFRO SEEDS**
08 Lotissement Al ISMAILIA [illegible] bureau 3
Berrechid 26100 (Maroc)
Tél. : +212 522 53 [illegible] 78
E-mail : cont[illegible]@afroseeds.ma

AFRO SEEDS

1kg

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE
الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

CARACTÉRISTIQUES

AYRON est un correcteur des déficiences en fer (chlorose ferrique) provoquées soit par un manque de cet élément dans le sol, soit parce qu'il se trouve sous une forme non assimilable par les plantes. Sa formulation combine l'action de réponse rapide du fer chélaté par EDDHA, favorisant ainsi le verdissement rapide.

Il corrige les carences en fer dans toutes les cultures : agrumes, vignes, maraîchères, arbres fruitiers, arbres en pépinières et plantes ornementales.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

AYRON peut être appliqué au sol avec tous les systèmes : injection, labour de soc, irrigation de surface, irrigation localisée, etc., puisque sa formulation spéciale est faite à base de microgranules totalement solubles, ce qui provoque qu'en peu de secondes AYRON soit totalement dissout. Il est recommandé d'appliquer le mélange immédiatement. Il est recommandé d'irriguer après l'application pour les cas où l'application ne se fait pas à travers l'eau d'irrigation.

ARBRES FRUITIERS ET AGRUMES : 50-100 g/arbre, pouvant aller jusqu'à 200 g/arbre dans les cultures comme le citron et l'avocat.

ARBRES EN PÉPINIÈRES : 2-3 g/plante ou 40-50 Kg/ha de surface.

VIGNE : 5-10 g/plante, jusqu'à 25 g/plante dans les cultures comme les treuilles.

CULTURES MARAÎCHÈRES ET ORNEMENTALES : 30-70 Kg/ha en fonction de la culture et l'état de la croissance.

CULTURES EXTENSIVES : 5-10 Kg/ha. Appliquer en l'incorporant dans le sol, directement ou par pulvérisation, à tout-terrain, avant le l'ensemencement ou la transplantation.

Selon l'intensité de la chlorose, utiliser la dose élevée ou basse dans les intervalles cités. Pour une meilleure assimilation et une efficacité optimale, il est recommandé réaliser des applications conjointes de AYRON avec Blackjak ou Perfectose.

ÉPOQUE DE TRAITEMENTS

Il est préférable d'appliquer le traitement au début de la pousse. Au fur et à mesure que l'on retarde l'application par rapport à cette période optimale, il est nécessaire d'augmenter les doses, même jusqu'au 100% dans les cas où l'on applique avec la végétation en plein développement.

Pour les cultures maraîchères, légumes et les ornementales, il est recommandé d'appliquer pendant la croissance active des plantes.

Son application est recommandée sous le conseil technique agronomique.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et de tests larges et rigoureux.

Toutefois, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir au cours de son utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.).

La marque garantit la composition, la formule et le contenu. L'usager est responsable des dommages causés (manque d'efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour non-respect total ou partiel des instructions de l'étiquette.

الخصائص:

إيرون هو مصحح لنقص عنصر الحديد (الاخضرار الحديدي) إما بسبب عدم وجود هذا العنصر في الأرض، وإما لأن صيغته صعبة الامتصاص بالنسبة للنبتة. تركيبته تجمع بين العمل السريع للحديد بواسطة EDDHA، وبالتالي يعزز من الاخضرار السريع للنبتة. انه يصحح من نقصان الحديد في جميع المحاصيل: الحمضيات، العنب، الخضروات، أشجار الفواكه وأشجار المشاتل ونباتات الزينة.

مقادير الاستعمال:

إيرون يمكن تطبيقه على التربة مع جميع الأنظمة، الحقن، والحرث لسكة، الري السطحي و الر بالتنقيط و غيرها، صياغتها الخاصة تمت بواسطة حبيبات قابلة للذوبان، و التي تسبب في بضع ثوان الذوبان الكلي لمنتج **إيرون**. يوصي باستعمال الخليط على الفور. فمن المستحسن تطبيق السقي مباشرة بعد الاستعمال في الحالات التي يكون فيها الاستعمال لا يتم بواسطة السقي.

أشجار الفواكه والحمضيات: 50-100 غرام للشجرة، قد تصل الى 200 غرام للشجرة في المحاصيل مثل الحمضيات و الأفوكا.

أشجار المشاتل: 2-3 غرام للنبتة أو 40-50 كلغ للهكتار.

الكروم: 5-10 غرام للنبتة قد تصل إلى 25 غرام للنبتة في المحاصيل مثل المعلقة.

الخضروات ونباتات الزينة: 30-70 كلغ للهكتار حسب نوع الزراعة و حالة النمو.
المحاصيل الواسعة: 5-10 كلغ للهكتار. تطبيق في التربة، مباشرة أو عن طريق الرش، في جميع أنواع التربة، قبل الزرع أو الغرس.

حسب شدة الاخضرار، استعمل الجرعة العالية أو العادية في الفترات المذكورة. لتحسين الامتصاص والفعالية، فمن المستحسن استعمال مشترك لمنتج إيرون مع بلاك جاك أو بيرفيكتوس.

وقت العلاج:

من الأفضل القيام بالتطبيق في بداية ظهور البراعم الصغيرة.

تدريجيا، يتم تأخير التطبيق فيما يتعلق بالفترة المثالية، فإنه من الضروري زيادة الجرعات، حتى تصل إلى نسبة 100% حيث يتم تطبيقها مع التطور الكامل للغطاء النباتي.

بالنسبة لمحاصيل الخضروات، والخضر ونباتات الزينة، يتم التطبيق أثناء نمو النباتات. من المستحسن تطبيقه حسب النصائح الفنية الزراعية.

تحذير:

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة للدراسات، واختبار، واسعة، ودقيقة.

ومع ذلك، عوامل كثيرة خارجة عن إرادتنا قد تحدث خلال استعمال (المخاليط، طريقة الاستعمال وعوامل المناخ، وما إلى ذلك). العلامة التجارية تضمن المكونات الموجودة في المحلول، والتركيبة والمحتوى.

المستعمل هو المسؤول عن الأضرار المتسببة بواسطة (فقص في الفعالية، تسمم النباتات بصفة عامة، النفايات، وما إلى ذلك) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي مع التعليمات على التسمية.

SIPCAM INAGRA

SPECIMEN