Efficient

إفـيـسيـون

Engrais liquide azoté contenant de l'urée formaldehyde 28.0.0
Sous forme de Concentré soluble (SL)

سماد سائل بالأزوت يحتوي على اليوري فورمالدهيد 28.0.0
مركز قابل للذوبان

ENGRAIS







CONTENU DÉCLARÉ

المحتوى المصرح

Azote (N) total .....28% p/p	الأزوت الكامل .....28 % وزن/وزن
Azote (N) uréique .....11% p/p	الأزوت اليوري .....11 % وزن/وزن
Azote (N) d'urée formaldéhyde .....17% p/p	الأزوت اليوري فورمالدهيد ..... 17 % وزن/وزن
Teneur maximale en biuret : inférieure à 0,7%	المحتوى الأقصى من البيوري: أقل من 0.7 %

Produit de :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Distribution exclusive : **ALFACHIMIE**
Lotissement Bouskoura Park, Lot 19
Ville Verte 20180 Bouskoura,
Casablanca (Maroc)
Tél. : (+212) 05 22 32 13 11
Fax : (+212) 05 22 32 12 93

منتج من طرف:
سيبكام اينافرا اس اية
الشارع بيلطران بكينا 5 - 11
46009 فالنسيا (أسبانيا)
الهاتف: 00 35 348 96 + 34

توزيع حصري: **الفشيمي**
تجزئة إسكان حديقة بوسكورة
دفعة 19 المدينة الخضراء 20180
بوسكورة، الدار البيضاء (المغرب)
هاتف: 11 13 32 22 05 (+212)
فاكس: 93 12 32 22 05 (+212)

ALFACHIMIE

Contenu net : 5 L
Date de fabrication :
Voir emballage
Lot de fabrication :
Voir emballage

المقدار الصافي: 5 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
رقم الدفعة: أنظر العبوة

5L

5 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE
الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح الغلاف

AGITER AVANT L'EMPLOI
يُرج قبل الاستخدام

SIPCAM
INAGRA

SPECIMEN

CARACTÉRISTIQUES

EFFICIENT est un engrais azoté à libération prolongée. Il contient deux formes d'azote : l'azote uréique qui répond aux besoins immédiats des cultures (effet « coup de fouet »), et l'azote issu de l'urée-formaldéhyde, qui assure une libération progressive et continue.

Facilement assimilable par les feuilles et les racines, **EFFICIENT** est spécialement conçu pour la fertilisation foliaire. Il est sûr pour les cultures et respectueux de l'environnement.

En application foliaire, **EFFICIENT** pénètre rapidement et forme un film protecteur qui limite les pertes d'azote dues aux pluies ou à l'humidité. L'azote est ensuite transformé en une forme assimilable par la plante grâce à l'hydrolyse chimique et à la dégradation microbienne, garantissant une libération progressive sur 8 à 10 semaines.

DOSES ET MODE D´EMPLOI

CULTURE	DOSES	ÉPOQUE ou MODALITÉ
Céréale	5-12 l/ha	1er traitement entre le stade de tallage complet et le premier nœud. 2ème traitement entre la feuille étendard et la floraison.
Maïs	5-7,5 l/ha	Post-émergence.
Pomme de terre	4-8 l/ha	Avant la floraison et applications tous les 10-14 jours.
Myrtillier	2,5-5 l/ha	Depuis avant la floraison, nouaison du fruit et répéter tous les 30 jours.
Framboisier	2,5-5 l/ha	Début de la floraison et répéter tous les 15 jours.
Vigne	2,5-5 l/ha	Avant la floraison et post-floraison.
Agrumes	2,5-5 l/ha	Différenciation florale et après la nouaison.
Olivier	2-6 l/ha	Depuis avant la floraison et répéter tous les 30 jours.
Arbres fruitiers	2,5-5 l/ha	Depuis avant la floraison, nouaison du fruit et répéter tous les 30 jours.
Cultures maraîchères	2,5-5 l/ha	Avant la floraison et applications tous les 10-14 jours.
Légumes à feuilles	4-8 l/ha	À la formation du cœur et répéter tous les 14 jours.
Fraisier	2,5-5 l/ha	Début de la floraison et répéter tous les 15 jours.
Gazon	5-8 l/ha	Applications tous les 50-60 jours.

PRÉCAUTIONS

EFFICIENT peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires disponibles sur le marché. Ne pas utiliser en mélange avec le tébuconazole sur les cultures de céréales d'hiver à des températures supérieures à 25°C. Il n'est pas compatible avec les produits très acides ni avec les solutions contenant du nitrate d'ammonium. Il est conseillé de réaliser un mélange préalable pour vérifier la compatibilité.

Remplir le réservoir jusqu'à la moitié, verser la quantité requise d'**EFFICIENT** avec l'agitateur en marche ajouter, si nécessaire, les produits phytosanitaires et appliquer immédiatement après.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P404 : Stocker dans un récipient fermé.

Contient Formaldéhyde. Peut produire une réaction allergique.

Stockage : Ne pas stocker le produit à des températures inférieures à -5°C ni supérieures à 30°C. Éviter les changements brusques de température. Conserver le produit dans son récipient d'origine fermé jusqu'à son utilisation.

Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant son acquisition.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfodis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, conditions climatiques, etc.). La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (efficacité toxicité en général, déchets, etc.) en cas de non-application totale ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.

الخصائص

إفيسيون هو سماد نيتروجيني يدوم تأثيره لفترة طويلة. يحتوي على شكلين من النيتروجين: النيتروجين اليوري، الذي يلبي احتياجات النبات الفورية (تأثير تنشيطي فوري)، والنيتروجين المستخرج من يوريا فورمالدهيد، الذي يضمن توفرًا تدريجيًا ومستمرًا للنيتروجين.

يتميز **إفيسيون** بسهولة امتصاصه عبر الأوراق والجذور، وهو مصمم خصيصًا للتسميد الورقي. كما أنه آمن تمامًا على المحاصيل وصديق للبيئة.

عند تطبيقه ورقيًا، يخترق **إفيسيون** الأنسجة بسرعة ويكوّن طبقة واقية تقلل فقدان النيتروجين بسبب الأمطار أو الرطوبة العالية. داخل الورقة، يتحول النيتروجين إلى شكل قابل للامتصاص عبر التحلل الكيميائي والتفكيك الميكروبي، مما يتيح تحريره بشكل تدريجي على مدى 8 إلى 10 أسابيع.

الجرع وطريقة الاستعمال

الزراعة	الجرعة	الفترة او طريقة التطبيق
الحبوب	5 -12 لتر/هك	المعالجة الأولى بين فترة التفرع الكامل وحتى العقدة الأولى. المعالجة الثانية بين ظهور الورقة الأخيرة والإزهار.
الذرة	5-7,5 لتر/هك	بعد الإنبات.
البطاطس	4-8 لتر/هك	قبل الإزهار وتطبيقات كل 10-14 يومًا.
التوت الأزرق	2,5-5 لتر/هك	قبل الإزهار وتشكل الفاكهة وأعد المعالجة كل 30 يومًا.
التوت	2,5-5 لتر/هك	بداية الإزهار وأعد التكرار كل 15 يومًا.
العنب	2,5-5 لتر/هك	قبل الإزهار وبعد الإزهار.
الحمضيات	2,5-5 لتر/هك	تمايز الأزهار وبعد التلقيح.
الزيتون	2-6 لتر/هك	قبل الإزهار وأعد المعالجة كل 30 يومًا.
الأشجار المثمرة	2,5-5 لتر/هك	قبل الإزهار و تشكل الفاكهة وأعد المعالجة كل 30 يومًا.
الخضراوات	2,5-5 لتر/هك	قبل الإزهار وتطبيقات كل 10-14 يومًا.
الخضراوات الورقية	4-8 لتر/هك	عند تكوّن البرعم وأعد التكرار كل 14 يومًا.
الفراولة	2,5-5 لتر/هك	بداية الإزهار وأعد التكرار كل 15 يومًا.
عشب أخضر	5-8 لتر/هك	تطبيقات كل 50-60 يومًا.

احتياطات الاستعمال

إفيسيون يجب مزجه مع معظم المنتجات الصحية النباتية المتوفرة في السوق. لا يُستخدم مع التيبكونازول على محاصيل الحبوب الشتوية عند درجات حرارة تتجاوز 25 درجة مئوية. إنه غير متوافق مع المنتجات الحمضية جدًا أو مع المحاليل التي تحتوي على نترات الأمونيوم. يُنصح بإجراء خلط مسبق للتحقق من التوافق.

قم بملء الخزان حتى نصفه، ثم صب الكمية المطلوبة من **إفيسيون** مع تشغيل المحرك، أضف، إذا لزم الأمر، المنتجات الصحية النباتية وطبقها فورًا بعد ذلك.

P102: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P270: ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتَج.

P404: يخزن في وعاء مغلق.

يحتوي على الفورمالدهيد. قد ينتج عنه رد فعل تحسسي.

التخزين: لا يجب تخزين المنتج في درجات حرارة أقل من -5 درجة مئوية أو أعلى من 30 درجة مئوية. تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. يُحفظ المنتج في عبوته الأصلية المغلقة حتى الاستخدام.

نوصي باستخدام المنتج خلال 12 شهراً من تاريخ شرائه.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتاج دراسات وتجارب دقيقة وشاملة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الخارجة عن إرادتنا التي قد تؤثر أثناء الاستخدام (تحضير الخلطات، التطبيق، الظروف المناخية، إلخ). تضمن الشركة التركيبة والصيغة والمحتوى. ويكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (مثل الكفاءة، السمية بشكل عام، المخلفات، إلخ) في حالة عدم الالتزام الكلي أو الجزئي بالتعليمات المذكورة على الملصق.

SPECIMEN