Liqui-K®

لكي-ك

Engrais Minéral pour application foliaire et fertirrigation
Concentré soluble (SL)

سماد معدني للاستخدام على الأوراق والتسميد بالري
مركز قابل للذوبان (SL)

ENGRAIS







CONTENU DÉCLARÉ

المحتوى المصرح به

Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau :
48% p/v (équivalent à 480 g/l)
pH>10

أكسيد البوتاسيوم (K_2O) قابل للذوبان في الماء:
48% وزن/حجم (ما يعادل 480 غ/ل)
pH>10

Marque et produit de :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

تصنيع و ماركة:

Distributeur Exclusif :
ALFACHIMIE
Lotissement Bouskoura Park,
Lot 19 Ville Verte
20180 Bouskoura, Casablanca
Tél.: (+212) 0675 000 134/133
(+212) 0522 321 311
Fax : (+212) 0522 321 293

الموزع الحصري:

ALFACHIMIE

Contenu Net : 5L
Date de Fabrication :
Voir emballage
Lot de Fabrication N° :
Voir emballage

المقدار الصافي: 5 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
رقم الدفعة: أنظر العبوة

5L

5لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

المرجو قراءة الملصق قبل فتح العبوة

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

SIPCAM INAGRA

SPECIMEN

CARACTERISTIQUES

LIQUI-K® contient un pourcentage élevé de POTASSIUM pour une utilisation immédiate et une absorption rapide par toutes les cultures. Le Potassium améliore la qualité organoleptique des fruits, des légumes et des cultures industrielles, etc., . Lorsqu'il est appliqué à la fin de la phase végétative (avant la récolte), il accélere la maturite, il augmente le calibre et la résistance aux conditions de stress. La présence d'une dose appropriée d'agent chélatants garantit la disponibilité totale du Potassium, indépendamment de la qualité de l'eau utilisée soit à travers des traitements foliaires et soit à travers la fertigation.

APPLICATIONS CONSEILLÉES

Il est conseillé d'utiliser **LIQUI-K®** comme un fertilisant de base sur toutes les cultures nécessitant du POTASSIUM (qualité, calibre ou taille, maturation anticipée, poids, etc.) En cas de déséquilibre potassium - calcium - magnésium, il est recommandé de corriger les carences en magnésium et/ou en calcium avant d'utiliser **LIQUI-K®** en utilisant PENALTY et/ou TONOFOL MG.

Culture	Dose	Problèmes Combattus
Arbres fruitiers	200 à 300 cc/hl	Calibre, Couleur, Carrences & Nutrition.
Agrumes	300 cc/hl	
Vigne	3 à 4 lt/ha	
Tomate	300 cc/hl	
Poivron	300 cc/hl	
Fruits Rouges	300 cc/hl	

DOSES, MODE D'EMPLOI ET PÉRIODE D'UTILISATIONS

APPLICATION FOLIAIRE : De 200 à 300 cc par 100 litres d'eau. Appliquer par voie foliaire pendant les moments où la plante a le plus besoin et qu'elle répond le plus rapidement (nouaison, grossissement et avant la récolte).

FERTIRRIGATION : De 3 à 5 litres par hectare.

STOCKAGE

Stocker le produit dans un endroit frais et ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

الخصائص

يحتوي **ليكي-ك** على نسبة عالية من البوتاسيوم للاستخدام الفوري والامتصاص السريع من قبل جميع المحاصيل. يحسن البوتاسيوم الجودة الحسية للفواكه والخضروات والمحاصيل الصناعية وغيرها. عند استخدامه في نهاية المرحلة النباتية (قبل الحصاد)، فإنه يسرع النضج ويزيد الحجم والمقاومة لظروف الإجهاد. يحتوي المنتج على جرعة مناسبة من عوامل التخلب التي تضمن التوافر الكلي للبوتاسيوم بغض النظر عن جودة المياه المستخدمة سواء من خلال المعالجة الورقية أو التسميد.

الاستعمالات الموصى بها

يُنصح باستخدام **ليكي-ك** كسماد أساسي لجميع المحاصيل التي تحتاج إلى البوتاسيوم (الجودة، الحجم أو القياس، النضج المبكر، الوزن، إلخ). في حالة وجود خلل في توازن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، يوصى بتصحيح نقص المغنيسيوم و/أو الكالسيوم قبل استخدام **ليكي-ك** باستخدام بنالتي و/أو طونوفول ام جي.

الزراعة	الجرعة	المشاكل المعالجة
أشجار الفاكهة	200 إلى 300 سم3/هـل	عيار، لون، أوجه القصور & تَغذِيَة
الحمضيات	300 سم مكعب/هـل	
العنب	3 إلى 4 لتر/هكتار	
الطماطم	300 سم مكعب/هـل	
الفلفل	300 سم مكعب/هـل	
الفواكه الحمراء	300 سم مكعب/هـل	

الجرعات وطريقة الاستعمال ومدة الاستخدام

التطبيق الورقي: من 200 إلى 300 سم مكعب لكل 100 لتر من الماء. يطبق على الأوراق في الأوقات التي تكون فيها النباتات في أمس الحاجة إليه وتستجيب له بسرعة أكبر (تكوين الثمار، النمو، وقبل الحصاد).

التسميد بالري: من 3 إلى 5 لتر/هكتار.

التخزين

يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة دراسة واختبار مكثف وصارم. ومع ذلك، قد تحدث العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا أثناء الاستخدام (تحضير الخلائط، والتطبيق، وعلم المناخ، وما إلى ذلك). تضمن الشركة التكوين والصياغة والمحتوى. سيكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (الفعالية، السمية بشكل عام، النفايات، إلخ) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي لتعليمات الملصق.

SPECIMEN