CARACTÉRISTIQUES

PERFECTOSE est un produit provenant de l'hydrolyse enzymatique d'extraits végétaux, qui assure une teneur maximale en isomères L, les seuls acides aminés biologiquement actifs. Grâce à sa teneur élevée en acides aminés libre et à sa rapide incorporation à la sève élaborée des plantes, apporte un moyen nutritif et stimulant, immédiatement utilisé par ces dernières. **PERFECTOSE** favorise tous les processus végétatifs : la croissance, l'induction florale, la nouaison et le développement des fruits (voir le tableau des doses et modes d'emploi). Il est spécialement conseillé de l'utiliser par voie foliaire ou fertirrigation et peut être mélangé avec les fertilisants conventionnels. **PERFECTOSE**, contient des substances complexantes qui favorisent l'absorption de ses micronutriments ainsi que ceux du sol.

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS

- Éviter d'appliquer le produit dans des solutions ayant un pH supérieur à 10.
- Ne pas appliquer par températures élevées (> 30°C).
- Il peut être mélangé avec la plupart des engrais foliaires et des produits phytosanitaires.
- Ne pas mélanger avec des huiles, du soufre ou des régulateurs de croissance sans expérience préalable concernant la réponse obtenue.
- Il n'est pas recommandé de mélanger avec plus de deux produits différents, même s'ils sont compatibles.
- Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préalable de compatibilité.

Stockage : Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 4°C et 40°C.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

CULTURE	EFFETS	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE ET MODE D'EMPLOI
AGRUMES	-Stimule la pousse et l'induction florale. -Améliore la nouaison, le développement et le calibre des fruits.	Commencer les applications au début de la floraison jusqu'au grossissement.	Foliaire : 2 à 4 L/Ha Fertirrigation : 4 à 8 L/Ha
AVOCATIER	-Améliore la nouaison, le développement et le calibre des fruits.	À partir du début de la floraison jusqu'au grossissement.	Foliaire : 3 à 4 L/Ha Fertirrigation : 4 à 6 L/Ha
TOMATE POIVRON	-Améliore l'enracinement et favorise la végétation.	De la transplantation jusqu'à la floraison.	Repartir de 5 à 6 L/Ha durant la période indiquée en 3-5 irrigations.
	-Améliore la nouaison.	Durant toute la période végétative.	Appliquer 2 à 3 L/Ha en pulvérisations foliaires.
FRAMBOISIER MYRTILLIER	-Favorise la végétation. -Améliore la nouaison.	Durant toute la période végétative.	Foliaire : 2 à 3 L/Ha Fertirrigation : 3 à 5 L/Ha
FRAISE	-Favorise la végétation. -Améliore la nouaison.	Durant toute la période végétative.	Réaliser plusieurs applications à la dose de 4 à 5 L/Ha par Fertirrigation.
POMME DE TERRE	-Augmente la production. -Régularise les calibres.	Commencer 30 jours après le démarrage.	Faire 2-3 applications à partir de la floraison : Foliaire : 2 à 4 L/Ha Fertirrigation : 6 à 10 L/Ha
OLIVIER	-Améliore (prolonge et renforce) les pousses. -Améliore la nouaison. -Evite la chute de jeunes fruits.	1-Au début de la pousse. 2-Au début de la floraison. 3-Fruits de la taille d'un petit pois.	Foliaire : 2 à 4 L/Ha Fertirrigation : 6 à 8 L/Ha
CUCURBITACÉES (MELON, PASTEQUE, CONCOMBRE, COURGETTE, CITROUILLE, ETC.)	-Améliore la floraison, nouaison et développement des fruits.	Au début de la floraison, nouaison et du grossissement.	Foliaire : 2 à 3 L/Ha Fertirrigation : 4 à 5 L/Ha
HARICOT VERT ET PETIT POIS	-Favorise la végétation. -Augmente la nouaison -Facilite la formation de gousses et de graines.	Lors de l'apparition des premiers boutons floraux et tous les 20 jours (avec un minimum de 3 applications).	Foliaire : 2 à 3 L/Ha Fertirrigation : 2 à 3 L/Ha

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/protection respiratoire/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5); octhilinone (ISO) (CAS: 26530-20-1)

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, conditions climatiques, etc.). La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) en cas de non-application totale ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.

Perfectose

بيرفيكتوز

Acides aminés
pour application foliaire et fertirrigation
« Concentré soluble (SL) »

أحماض أمينية
للتطبيق الورقي والتسميد بالري
مركز قابل للذوبان

COMPOSITION GARANTIE

Acides aminés totaux	21% p/v
Acides aminés libres	11% p/v
Azote (N) total	8,05% p/v
Azote organique	4,7% p/v
Azote ammoniacal	3,35% p/v
Matière organique	37,82% p/v

التركيبة المضمونة

إجمالي الأحماض الأمينية	21% وزن/حجم
الأحماض الأمينية الحرة	11% وزن/حجم
إجمالي الأزوت	8,05% وزن/حجم
الأزوت العضوي	4,7% وزن/حجم
الأزوت الأمونيائي	3,35% وزن/حجم
المواد العضوية	37,82% وزن/حجم

Fournisseur :
SIPCAM INAGRA, S. A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

المورد:
سيكام ايناقرا . اس . ايه
الشارع بيلطران بكينا 5 - 11
46009 فالانسيا (اسبانيا)
الهاتف: 500 483 963 34 +

Importé et distribué par :
Omnium Agricole du Souss
Zone industrielle
Tassila III - Agadir (Maroc)
Tél : 0528 33 10 10
Fax : 0528 33 35 82

مستورد وموزع من قبل:
أومنيوم فلاحي سوس
م. ص. تاسيلا III أكادير (المغرب)
هاتف: 0528 33 10 10
فاكس: 0528 33 35 82

CONTENU NET : 25 L
DATE DE FABRICATION : Voir emballage
LOT DE FABRICATION N° : Voir emballage

المقدار الصافي: 25 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر الغلاف
رقم الدفعة: أنظر الغلاف

ENGRAIS

25L

25لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

يجب قراءة الملصق قبل فتح العبوة

AGITER AVANT EMPLOI

يُرج قبل الاستخدام

SIPCAM INAGRA

الخصائص

بيرفيكتوز ناتج عن التحليل الأنزيمي للمستخلصات النباتية ، التي تضمن الحد الأقصى لمحتوى المتماكبات (L)، هي الأحماض الأمينية الوحيدة ذات النشاط البيولوجي. بفضل ارتفاع محتوى الأحماض الأمينية الحرة و اندماجه السريع في نسغ النباتات ، يوفر **بيرفيكتوز** المواد المغذية و المحفزة اللازمة للنباتات و يتم استعماله فورا من طرفها. **بيرفيكتوز** يعزز جميع مراحل نمو الخضر و الفواكه (انظر الجدول عن وقت و مقادير الاستعمال، تحت عنوان: الفعالية). من المستحسن استخدامه عن طريق الرش الورقي أو التسميد بالري، ويمكن خلطه مع الأسمدة التقليدية. **بيرفيكتوز** ، يحتوي على مواد اضافية تعزز امتصاص المغذيات الدقيقة من طرف النباتات فضلا عن تلك المتواجدة بالتربة.

الاحتياطات و النصائح

- تجنب تطبيق المنتج في المحاليل التي تحتوي على درجة حموضة أعلى من 10.
- تجنب التطبيق عند درجات حرارة مرتفعة (<30°C).
- مكن مزجه مع معظم الأسمدة الورقية والمبيدات النباتية.
- لا يتم خلطه مع الزيوت أو الكبريت أو منظمات النمو إذا لم تكن لديك خبرة في استجابة الخليط.
- لا ينصح بخلطه مع أكثر من منتجين مختلفين، حتى لو كانا متوافقين.
- في جميع الحالات، ينصح دائما بإجراء اختبار التوافق المسبق.

التخزين: يحفظ المنتج في عبوته الأصلية المغلقة في درجة حرارة تتراوح بين 4 درجات مئوية و40 درجة مئوية.

جرعات وتعليمات الاستخدام

المزروعات	المفعول	فترة التطبيق	الجرعة وطريقة الاستعمال
الحمضيات	-يحفز النمو والتحفيز الزهري. -يحسن تكوين الثمار، وتطورها، وحجمها.	ابدأ التطبيقات من بداية الإزهار حتى تضخم الثمار.	تطبيق ورقي: 2 - 4 لتر/هك التسميد بالري: 4 - 8 لتر/هك
الأفوكادو	-يحسن تكوين الثمار، وتطورها، وحجمها.	من بداية الإزهار حتى مرحلة التضخم.	تطبيق ورقي: 3 - 4 لتر/هك التسميد بالري: 4 - 6 لتر/هك
الطماطم الفلفل	-يحسن التجذير ويعزز النمو النباتي. -يحسن تكوين الثمار.	من الزراعة حتى الإزهار. خلال فترة النمو النباتي.	توزيع من 5 إلى 6 لتر/هكتار خلال الفترة المحددة في 3-5 ريات تطبيق 2 إلى 3 لتر/هكتار عن طريق الرش الورقي
التوت التوت الأزرق	-يعزز النمو النباتي. -يحسن تكوين الثمار.	خلال فترة النمو النباتي.	تطبيق ورقي: 2 - 3 لتر/هك التسميد بالري: 3 - 5 لتر/هك
الفراولة	-يعزز النمو النباتي. -يحسن تكوين الثمار.	خلال فترة النمو النباتي.	جراء عدة تطبيقات بجرعة 4 إلى 5 لتر/هكتار عن طريق التسميد بالري.
البطاطس	-يزيد الانتاج. -ينظم الأحجام.	ابدأ التطبيق بعد 30 يومًا من نمو النبات.	قم بإجراء 2-3 تطبيقات ابتداءً من الإزهار: تطبيق ورقي: 2 - 4 لتر/هك التسميد بالري: 5 - 6 لتر/هك
الزيتون	-يحسن (يُطيل ويقوي) النمو. -يحسن تكوين الثمار. -يمنع تساقط الثمار الصغيرة.	تطبيق ورقي: 2 - 4 لتر/هك التسميد بالري: 6 - 10 لتر/هك 1- بداية النمو. 2- بداية الإزهار. 3- ثمار بحجم حبة البازلاء.
القرعيات (البطيخ، الدلاح، الخيار، القرع، الياقطين، إلخ)	-يحسن الإزهار، تكوين الثمار وتطورها.	تطبيق ورقي: 2 - 3 لتر/هك التسميد بالري: 4 - 5 لتر/هك بداية الإزهار، عقد الثمار وتضخمها.
الفاصوليا الخضراء والبازلاء	-يعزز النمو النباتي. -يزيد تكوين الثمار. -يسهل تكوين القرون والبذور.	تطبيق ورقي: 2 - 3 لتر/هك التسميد بالري: 2 - 3 لتر/هك عند ظهور البراعم الزهرية الأولى وكل 20 يومًا (مع الحد الأدنى من 3 تطبيقات).

تحذيرات و احتياطات

H412: ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

H317: قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل وعاء أو بطاقة الوسم في متناول اليد. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. تجنب تنفس الأبخرة. لا يسمه بارتداء ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. تجنب انطلاق المادة في البيئة. إرتداء القفازات والملابس الواقية، ومعدات لحماية العينين والوجه وأحذية طويلة الساقين. في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء. إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استخدامها. تخلص من المحتويات و/أو الحاوية الخاصة بها من خلال نظام التجميع الانتقائي المفعل في بلديتك.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتاج دراسات وتجارب دقيقة وشاملة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الخارجة عن إرادتنا التي قد تؤثر أثناء الاستخدام (تحضير الخلطات، التطبيق، الظروف المناخية، إلخ). تضمن الشركة التركيبة والصيغة والمحتوى. ويكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (مثل الكفاءة، السمية بشكل عام، المخلفات، إلخ) في حالة عدم الالتزام الكلي أو الجزئي بالتعليمات المذكورة على الملصق.

SPECIMEN