Stilo Racine

ستيلو راسين

Acides aminés avec des micronutriments pour la fertirrigation et la préparation de solutions nutritives
Suspension concentrée (SC)

أحماض أمينية مع المغذيات الدقيقة للري بالتسميد وتحضير المحاليل المغذية
مركّز معلق

BIOSTIMULANT



CONTENU DÉCLARÉ

المحتوى المصرح به

Extrait humique total	17.00 % p/p	مستخلص الدبال الاجمالي	17.00 % وزن/وزن
Acide humique	15.50 % p/p	حمض دبالي	15.50 % وزن/وزن
Acide fulvique	1.50 % p/p	حمض الفولفيك	1.50 % وزن/وزن
Acide aminé libre	6.50 % p/p	حمض أميني حر	6.50 % وزن/وزن

Contenu net : 5 L
Date de fabrication : Voir emballage
Date de conservation : 3 ans
Lot de fabrication N° : Voir emballage

المقدار الصافي: 5 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Marque et produit de :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5-11
46009 Valencia (Espagne)

العلامة التجارية والمنتج:

Importateur : **SIPCAM INAGRA MAROC SARL AU**
N° 260 Route 206 Quartier Industriel - KENITRA (Maroc)

المستورد:

Distribution exclusive : **AFROSEEDS**
08 Lotissement AL ISMAILIA
1er étage bureau 3
Berrechid, 26100 (Maroc)
Tél. : +212 522 533 398
Email : contact@afroseeds.ma
Site-web : www.afro-seeds.com

الموزع الحصري:

AFRO SEEDS

5L

5لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITER AVANT L'EMPLOI

يُرج قبل الاستخدام

SIPCAM INAGRA

SPECIMEN

CARACTÉRISTIQUES

STILO RACINE est un biostimulant innovant conçu pour améliorer l'enracinement des plantes. Grâce à sa formulation avancée, il favorise une croissance racinaire robuste et une meilleure santé des cultures.

STILO RACINE optimise également la structure du sol, réduit la salinité et améliore l'absorption des nutriments. Ce produit unique aide les plantes à développer un système racinaire puissant et à maximiser leur vigueur.

USAGES AGRICOLES

CULTURE	APPLICATION	DOSES
Maraîchères à fruit (tomate, aubergine, poivron, courge, melon, pastèque, concombre, courgette, etc)	Pour favoriser l'enracinement après la transplantation ou lors de situations particulièrement demandantes pour la culture (floraison, pics de production, récupération des situations de stress, etc).	3-5 L/Ha
Maraîchères à racine, bulbe et tubercule (pomme de terre, oignon, carotte, etc)	Pour favoriser l'enracinement après la transplantation ou dans l'apparition de la seconde feuille vraie en cas de semis direct.	3-5 L/Ha
Maraîchères à feuilles et fleurs (chou, chou-fleur, laitue, céleri, brocoli, épinard, scarole, artichaut, etc)	Pour favoriser l'enracinement après la transplantation ou dans l'apparition de la seconde feuille vraie en cas de semis direct.	3-5 L/Ha
Fraise, Framboise, Canneberge	Après la transplantation dans les nouvelles plantations et au début de l'activité des racines après le repos hivernal pour les plantations déjà établies.	3-5 L/Ha
Arboriculture (agrumes, fruitiers, raisin de table, vigne, olivier, etc)	Après la transplantation dans les nouvelles plantations et au début de l'activité des racines après le repos hivernal pour les plantations déjà établies.	3-5 L/Ha
Bananière	Après la transplantation dans les nouvelles plantations et 1-3 applications après la feuille épée. Cette pratique est aussi valable pour les générations suivantes.	3-5 L/Ha
Cultures extensives (maïs, maïs doux, coton, céréales, tabac, tournesol, etc)	Appliquer par voie foliaire pour favoriser l'incorporation du produit dans le sol, avec abondante bouillie.	3-5 L/Ha

CONSEILS ET COMPATIBILITÉS

STILO RACINE devrait être appliqué en fertirrigation, pour favoriser l'enracinement après la transplantation et après la première irrigation. Le produit peut être appliqué, aussi, quand les racines sont actives. Il est recommandé de répéter le traitement 15 jours après en fonction des besoins nutritionnels des plantes et de l'évolution de la culture.

Grâce à son pH et composition, **STILO RACINE** peut être mélangé avec la plupart d'engrais et phytosanitaires. En tout cas, il est recommandé de réaliser toujours un essai préalable de compatibilité.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

EUH208 : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique

Stockage : Stocker le produit dans un endroit frais et ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et informations que nous fournissons sont le fruit d'études et de tests larges et rigoureux. Toutefois, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir au cours de son utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La marque garantit la composition, la formule et le contenu. L'usager est responsable des dommages causés (manque d'efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour non-respect total ou partiel des instructions de l'étiquette.

الخصائص

ستيلو راسين هو محفز حيوي مبتكر مصمم لتحسين تجذير النباتات. بفضل تركيبته المتقدمة، يعزز نمو الجذور بشكل قوي وصحة أفضل للمحاصيل.

كما يعمل **ستيلو راسين** على تحسين بنية التربة، تقليل الملوحة، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. هذا المنتج الفريد يساعد النباتات على تطوير نظام جذري قوي وزيادة حيويتها.

الاستخدامات الزراعية

الزراعة	الاستعمال	الجرعة
الخضروات (الطماطم و الباذنجان و الفلفل و القرع و البطيخ، الدلاح و الخيار و الكوسة و غيرها)	لتعزيز التجذير بعد الغرس أو في الحالات التي تكون فيها الزراعة متطلبة بشكل خاص (مثل الإزهار، ذروة الإنتاج، استعادة الحالات المجهدة، إلخ).	3-5 لتر / هكتار
الخضروات الجذرية، بصيلة و درنة (البطاطس و البصل و الجزر، وما إلى ذلك)	لتعزيز التجذير بعد الغرس أو عند ظهور الورقة الثانية الحقيقية في حالة الزرع المباشر.	3-5 لتر / هكتار
الخضروات مع الأزهار و الأوراق (الملفوف، والقرنبيط ، الخس ، الكرفس، و البروكلي ، و السبانخ، الهندباء، الخرشوف، الخ)	لتعزيز التجذير بعد الغرس أو عند ظهور الورقة الثانية الحقيقية في حالة الزرع المباشر.	3-5 لتر / هكتار
الفراولة ، توت العليق، التوت البري	بعد الغرس في الزرعات الجديدة وفي بداية نشاط الجذور بعد فترة الراحة الشتوية للزراعات القائمة.	3-5 لتر / هكتار
التشجير (الحمضيات و العنب، الكروم، الزيتون، إلخ)	بعد الغرس في الزرعات الجديدة وفي بداية نشاط الجذور بعد فترة الراحة الشتوية للزراعات القائمة.	3-5 لتر / هكتار
الموز	بعد الغرس في الزرعات الجديدة و1-3 تطبيقات بعد ظهور الورقة الشريطية. هذه الممارسة صالحة أيضًا للأجيال التالية.	3-5 لتر / هكتار
المحاصيل الأخرى (الذرة، الذرة الحلوة، و القطن و الحبوب و التبغ، و عباد الشمس، الخ)	يتم تطبيقه عن طريق الرش الورقي لتسهيل إدماج المنتج في التربة، مع استخدام كمية وفيرة من المزيج.	3-5 لتر / هكتار

نصائح و التقابلية

يجب استخدام **ستيلو راسين** كوسيلة للري بالتسميد لتشجيع التجذير بعد الزرع وبعد الري الأول. يمكن أيضاً استخدام المنتج عندما تكون الجذور نشطة. يُنصح بتكرار المعالجة بعد 15 يومًا، اعتمادًا على الاحتياجات الغذائية للنباتات وتطور المحصول.

يمكن مزج **ستيلو راسين** مع معظم الأسمدة ومنتجات وقاية النباتات بفضل درجة حموضته وتركيبته. على أي حال، يُنصح بإجراء اختبار التوافق مسبقاً.

P102:يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P270:ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتَج

EUH208:يحتوي على 1.2-بنزوثيازول -3(2H)-آون. قد ينتج عنه رد فعل تحسسي .

التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة دراسة واختبار مكثف وصارم. ومع ذلك ، قد تتدخل العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا تحدث خلال استعمال (تحضير المخاليط ، والتطبيق، و عوامل المناخ ، وما إلى ذلك). تضمن الشركة التكوين والصياغة والمحتوى. المستعمل هو المسؤول عن الأضرار المتسببة بواسطة (الفعالية ، السمية بشكل عام ، النفايات، إلخ) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي للتعليمات الموجودة على الملصق.

SPECIMEN