CARACTÉRISTIQUES :

STILO SOL est un produit fertilisant à double usage. D'une part, c'est un excellent dessalant à base de calcium complexé par des sels d'acide lignosulfonique, communément appelés polycarboxylates, offrant une très grande stabilité.

D'autre part, son application au sol conduit à une amélioration des niveaux de calcium disponible pour la nutrition des plantes, améliorant ainsi les propriétés physiques-chimiques du sol.

MODE ET DOSE D'APPLICATION :

Il est nécessaire d'ajuster le dosage et l'application en fonction des caractéristiques du sol et de l'état nutritionnel de la culture. En tant qu'agent dessalant, la dose dépendra directement de la conductivité du sol, du pourcentage de sodium échangeable et du type de culture.

Nous recommandons une application à faibles doses réparties sur 4 à 8 fois (en fonction de la durée du cycle de culture) pour corriger progressivement la salinité du sol.

CULTURE	MOMENT D'APPLICATION	Kg/Ha	DOSE TOTALE PAR CYCLE Kg/Ha
Fruits Rouges : (Fraise, framboise, myrtille)	10 à 15 jours après la transplantation, répéter tous les 7 à 10 jours	1-2	10
Bulbes et tubercules (oignon, ail, pomme de terre, carotte)	À 10 ou 15, 30, 45 et 60 jours après la transplantation ou la levée des plantules	2-3	10
Agrumes (orange, mandarine, citron), pamplemousse, pomme, poire, pêche, cerise, abricot, prune, olive...)	Tous les 15-20 jours, jusqu'à la fin du cycle de croissance productif	1-2	12
Fruits tropicaux (Mangue, papaye, avocat, goyave, banane...)	Effectuer des applications régulières tous les 15 à 20 jours	2-3	15
Cultures à feuilles (laitue, épinards, blettes, chicorée, céleri, chou-fleur, brocoli...)	A 10 ou 15, 25, 40 et 55 jours	1-2	5
Tomate, poivron, concombre, courge, haricots, petits pois,...	À 10 ou 15 jours de la transplantation ou de la levée de la culture, appliquer tous les 7 à 10 jours jusqu'à la fin de la culture	1-2	10
Melon - Pasthèque	A 10 ou 15, 30, 45 jours après la transplantation, développement précoce des fruits et après chaque coupe	1-2	10
Ornementales, fleurs	À partir d'une transplantation ou d'une coupe, appliqué tous les 7 à 10 jours	1	5

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS :

Évitez d'appliquer lorsque les températures sont élevées (≥ 30ºC). Ce produit peut être mélangé à la plupart des engrais et pesticides foliaires, mais ne le mélangez pas avec des huiles ou du soufre.

En toutes circonstances, il est conseillé de réaliser un test de compatibilité préliminaire avant le mélange.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à des températures comprises entre 0°C et 40°C.

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets (Annexe II de l'article R 541-8 du code de l'environnement, Décret no 2011-828, Ordonnance no 2010-1579, Article 256 de la loi n° 2010-788, Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012, Décret N° 2012-602 du 30 avril 2012).

MENTIONS DE DANGER :

Indications de danger
H302 - Nocif en cas d´ingestion.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.



AVERSTISSEMENT :

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

Stilo Sol®

ستيلو سول®

Bionutriment.
Correcteur de salinité et de calcium.

مغذي حيوي.
معالج للملوحة والكالسيوم.

COMPOSITION — التركيبة

Calcium complexé à pH 9 (CaO) : 20% p/p
Agent complexant : Acides lignosulfonique

كالسيوم معقد عند درجة الحموضة 9 (CaO): 20% وزن/وزن
وكيل التعقيد: حمض الليغنوسلفونيك

Contenu net : 1 Kg
Date de fabrication : voir emballage
Durée de conservation : 3 ans
Lot de fabrication N° : voir emballage

المقدار الصافي: 1 كيلوغرام
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Firme et fabrication :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5-11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Importé et Distribué exclusivement par :
AFROSEEDS
08 Lotissement Al ISMALIA,
1ère étage bureau 3 - Berrechid 26100
Tél. : +212 522 533 398
E-mail : contact@afroseeds.ma

AFROSEEDS

SIPCAM INAGRA

CORRECTEUR







1kg

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

يجب قراءة الملصق قبل فتح العبوة

الخصائص:

تم تصميم **ستيلو سول** كمنتج للتسميد ذو استخدام مزدوج. فهو عبارة عن عامل مزيل ممتاز للأملاح معتمد على الكالسيوم المعقد بملح حمض الليغنوسلفونيك، المعروف أيضًا بشكل شائع باسم البوليكاربوكسيلات، مما يوفر استقرارًا كبيرًا للغاية.

من ناحية أخرى، يؤدي تطبيقه على التربة إلى تحسين مستويات الكالسيوم المتاحة لتغذية النباتات، مما يعزز الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة

طريقة وجرعة التطبيق:

من الضروري ضبط الجرعة والتطبيق بناءً على خصائص التربة والحالة التغذوية للمحصول. بالنسبة لوكيل تنظيف الملوحة، فإن الجرعة ستعتمد مباشرة على توصيلية التربة ونسبة الصوديوم المتبادل ونوع المحصول.

نوصي بتطبيق جرعات منخفضة موزعة على 4 إلى 8 مرات (اعتمادًا على مدة دورة النمو) لتصحيح ملوحة التربة تدريجيا

الزراعات	لحظة التطبيق	كيلوغرام/هكتار	الجرعة الإجمالية لكل دورة (كجم/هكتار)
فواكه حمراء: (فراولة، توت أحمر، توت أزرق)	بعد 10 إلى 15 يومًا من الزراعة، كرر كل 7 إلى 10 أيام.	1-2	10
المَصابيح والدَّرَنَات (البصل، الثوم، البطاطس، الجزر)	بعد 10 أو 15 يومًا، 30، 45، و60 يومًا من الزراعة أو نشأة الشتلات.	2-3	10
الحمضيات (البرتقال، اليوسفي، الليمون)، الجريب فروت، التفاح، الكمثرى، الخوخ، الكرز، المشمش، البرقوق، الزيتون...	كل 15-20 يومًا، حتى نهاية دورة النمو الإنتاجية.	1-2	12
الفواكه الاستوائية (المانجو، البابايا، الأفوكادو، الجوافة، الموز...)	تنفيذ تطبيقات منتظمة كل 15 إلى 20 يومًا.	2-3	15
المحاصيل الورقية (الخس، السبانخ، السلق، الهندباء، الكرفس، القرنبيط، البروكلي...)	بعد 10 أو 15 يومًا، 25، 40، و55 يومًا.	1-2	5
الطماطم، الفلفل الحلو، الخيار، القرع، الفاصوليا، البازلاء الصغيرة...	بعد 10 أو 15 يومًا من الزراعة أو الإنبات، قم بتطبيق كل 7 إلى 10 أيام حتى نهاية الموسم الزراعي.	1-2	10
البطيخ - الشمام	بعد 10 أو 15 يومًا، 30، و45 يومًا بعد الزراعة، وبعد كل جني، لتطوير الفاكهة في المراحل المبكرة.	1-2	10
زهور، نباتات زينة	بدءًا من الزراعة أو القص، قم بالتطبيق كل 7 إلى 10 أيام.	1	5

نصائح وعدم التوافق:

تجنب التطبيق عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة (≤ 30ºC). يمكن مزج هذا المنتج مع معظم الأسمدة والمبيدات الورقية، لكن لا تخلطه مع الزيوت أو الكبريت. في جميع الأحوال، من النصح بإجراء اختبار توافق مسبق قبل الخلط.

يُحفظ المنتج في عبوته الأصلية مغلقة عند درجات حرارة تتراوح بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

تغسل اليدان جيداً بعد المناولة. ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتَج. تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجهه. في حالة الابتلاع: اتصل بمركز مكافحة السموم / طبيب في حالة الشعور بالتوعك. في حالة خول العين: أشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. قم بإزالة العدسات اللاصقة إذا كانت الضحية ترتديها ويمكن إزالتها بسهولة. واصل الشطف.

تخلص من المحتويات/الوعاء وفقًا للتشريعات الحالية لمعالجة النفايات (المرفق الثاني من المادة R 541-8 من قانون البيئة، المرسوم الصادر بالعدد 828-2011، المرسوم الصادر بالعدد 1579-2010، المادة 256 من القانون رقم 788-2010، المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 03 أكتوبر 2012 والصادر في 06 نوفمبر 2012، المرسوم رقم 602-2012 المؤرخ في 30 أبريل 2012).

التحذيرات و المخاطر:



تحذيرات الخطر
H302 - ضار إذا إبتلع
H318 - يسبب أضرارًا جسيمة للعين.

تحذير:

التوصيات والمعلومات التي نقدمها ناتجة عن دراسات وتجارب مفصلة وصارمة. ومع ذلك، يمكن أن تتدخل العديد من العوامل التي لا يمكننا التحكم فيها أثناء الاستخدام (تحضير الخلطات، التطبيق، والظروف الجوية، إلخ). تضمن الشركة التركيبة والصياغة والمحتوى. سيكون المستخدم مسؤولًا عن الأضرار التي قد تحدث (الكفاءة، السمية بشكل عام، النفايات، إلخ.) نتيجة الإهمال الكلي أو الجزئي لتعليمات العلامة

SPECIMEN