CARACTÉRISTIQUES :

STILO VERT est un biostimulant spécialement développé pour son application foliaire en grandes cultures comme céréales, maïs, riz, olivier, pomme de terre et autres (voir le tableau). Son utilisation stimule une résistance à situations de stress abiotique (sécheresses, chaleurs excessives, salinité, traitements herbicides, etc.), ce qui se traduit par une meilleure croissance végétative, un meilleur rendement optimal et de meilleurs paramètres de la qualité de la récolte.

STILO VERT est un produit provenant de l'hydrolyse enzymatique d'extraits végétaux, qui assure une teneur maximum en isomères « L », les seuls acides aminés biologiquement actifs. Grâce à sa teneur élevée en acides aminés libres et à sa rapide incorporation à la sève élaborée des plantes, apporte un moyen nutritif et stimulant, immédiatement utilisé par ces cultures. Présente un contenu total du 16.50% en acides aminés et 31% p/p en matière organique.

STILO VERTcontient du Zinc et du Manganèse chélaté par EDTA, il est donc très efficace pour corriger ou prévenir les états carentiels des micro-éléments.

DOSES ET MODE D'EMPLOI :

CULTURE	EFFETS	PERIODE D'APPLICATION	DOSE ET MODE D'EMPLOI
Tabac	- Stimule la végétation. - Favorise le caillement.	Depuis la transplantation, dans les moments de stress.	Appliquer 2-3 L/ha en pulvérisation foliaire.
Légumineuses fourragères	- Stimule la végétation. - Facilite le caillement. - Améliore le contenu en protéines.	Au début de la formation de la troisième feuille, dans les moments de stress.	
Maïs	- Stimule la végétation. - Favorise l'assimilation des nutriments.	Au début de la formation de la quatrième feuille, dans les moments de stress.	
Céréales	- Favorise le tallage. - Augmente la production et le poids spécifique. - Améliore le contenu en protéines.	En mélange avec herbicides et fongicides dans les applications exécutées en post-levée, pour pallier le stress provoquée sur la culture.	
Luzerne	- Favorise le développement végétatif. - Avance et augmente la production.	Étapes initiales du cycle de culture, dans les moments de stress.	
Betterave	- Stimule la végétation. - Favorise le développement foliaire et radiculaire.	Au stade de 2–4 feuilles, dans les moments de stress profitant l'application des produits phytosanitaires.	
Olivier	- Augmente la pousse. - Améliore la floraison et le caillement.	Appliquer dans les traitements au printemps.	
Fruitiers à coque (amandier, pistache, noisetier, noyer)	- Augmente la pousse. - Améliore la floraison et le caillement.	Appliquer dans les traitements au printemps.	
Pomme de terre	- Stimule la végétation. - Favorise le développement foliaire et la formation de tubercules.	Au stade de 2–4 feuilles, dans les moments de stress causés par l'application des produits phytosanitaires (appliquer conjointement).	
Riz	- Favorise le tallage. - Augmente la production et le poids spécifique.	En mélange avec herbicides et fongicides dans les applications exécutées en post-levée, pour pallier le stress provoquée sur la culture.	

PRÉCAUTIONS :

Eviter l'application du produit dans des bouillies à pH supérieur à 10. Ne pas appliquer avec des hautes températures (>30°C). Il peut être mélangée avec la plupart des engrais foliaires et phytosanitaires. Ne pas mélanger avec huiles, soufre, phytosanitaires nitroderivés ou avec phytorégulateurs si vous n'avez pas d'expérience. Il n'est pas recommandé le mélanger avec plus de deux produits différents, même compatibles.

Il est recommandé de faire une preuve préalable de compatibilité.

STOCKAGE :

Conserver le produit dans l'emballage d'origine fermé à des températures comprises entre 5ºC et 30ºC.

AVERTISSEMENT :

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

Stilo Vert

ستيلو فير

Acides aminés avec micronutriments
pour application foliaire
CONCENTRÉ SOLUBLE (SL)

الأحماض الأمينية مع العناصر الغذائية الدقيقة
للاستعمال على الأوراق
مركز قابل للذوبان

COMPOSITION

Azote total (N) 6,08%
Azote organique 2,71%
Azote ammoniacal 3,37%
Acides aminés libres 10%
Manganèse (Mn) chélaté EDTA 0,10%
Zinc (Zn) chélaté EDTA 0,10%

CONTENU NET : 1L
DATE DE FABRICATION : Voir emballage
DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans
LOT DE FABRICATION Nº : Voir emballage

المقدار الصافي: 1 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
مدة التخزين: سنتان
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Importateur : المورد
SIPCAMINAGRA MAROC SARL AU
N° 260 Route 206
Quartier Industriel
KENITRA (Maroc)

Distributeur exclusif : الموزع الحصري
AFRO SEEDS
08 Lotissement Al ISMALIA, 1ère étage bureau 3,
Berrechid 26100 - Maroc
Tél. :+212 522 533 398
E-mail : contact@afroseeds.ma

AFRO SEEDS

SIPCAM
INAGRA





BIOSTIMULANT

1 L

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

الخصائص

Stilo Vert هو مغذي و منشط النبات انتج خصيصا للاستعمال عن طريق الاوراق على العديد من الزراعات الكبرى مثل الحبوب والذرة والأرز والزيتون والبطاطا وغيرها (انظر الجدول). استعماله يحفز مقاومة أفضل للظروف غير الحيوية الإجهاد (الجفاف والحرارة المفرطة، والملوحة، ومبيدات الأعشاب، الخ)، مما يؤدي الى نمو أفضل لاوراق،أفضل انتاج وأفضل نوعية للمحصول. Stilo Vert هو منتج مشتق من التحليلات الإنزيمية من المستخلصات النباتية، التي تضمن أقصى قدر من أيزومرات محتوى "L"، والأحماض الأمينية نشيطة بيولوجيا. وذلك بفضل نسبة عالية من الأحماض الأمينية الحرة ودخوله السريع للعصارة النباتية المنتجة من النباتات،

Stilo Vert يوفر وسيلة مغذية ومنشطة للنباتات ، فورا عند رشه على النبات.Stilo Vert يحتوي على نسبة مجموع 16.50٪ في الأحماض الأمينية و 31٪ وزن/وزن من المواد العضوية.

Stilo Vert يحتوي على الزنك والمنغنيز معالج عن طريق عملية إزالة معدن ثقيل مع EDTA. ولذلك فهو فعال جدا لتصحيح أو معالجة النقص في العناصرالغذائية الصغرى.

كيفية الاستعمال

الزراعات	طريقة التأثير	فترة الاستعمال	كمية الاستعمال
زراعة التبغ	يحفز تشكيل الأوراق	منذ عملية الزرع، في أوقات الشدة.	تطبيق 2-3 لتر / هكتار كمواد رش ورقي.
البقوليات العلفية	يحفز تشكيل الأوراق تحسين محتوى البروتين.	في بداية تشكيل الورقة الثالثة في أوقات الشدة.	
زراعة الذرة	يحفز تشكيل الأوراق يزيد من امتصاص المواد الغذائية	في بداية تشكيل الورقة الرابعة في أوقات الشدة.	
الحبوب	يزيد البروتين. زيادة الإنتاج واختبار الوزن. يحسن محتوى البروتين في إنتاج المحصول.	تمزج مع مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات في التطبيقات التي تعمل بعد ظهور الأوراق الأولى للتخفيف من حدة التوتر التي تلحق المحصول.	
القصة	يشجع نمو النباتات. تقدم ويزيد الإنتاج.	للمراحل الأولى من دورة المحصول، في أوقات الشدة.	
سكر الشمندر	تشجيع تطوير الأوراق وتشكيل الدرنات	في مرحلة 2-4 أوراق، في أوقات التوتر الناجم عن تطبيق منتجات الصحة النباتية	
زراعة الزيتون	يحفز تشكيل الأوراق يحفز الإزهار	تطبيق مع المعالجة الربيع.	
الأشجار الفاكهة مثل المكسرات (اللوز، الفستق، البندق، الجوز)	يحفز تشكيل الأوراق يحفز الإزهار	تطبيق مع المعالجة الربيع.	
البطاطس	تشجيع تطوير الأوراق وتشكيل الدرنات	في مرحلة 2-4 أوراق، في أوقات التوتر الناجم عن تطبيق منتجات الصحة النباتية	
زراعة الأرز	يزيد البروتين. زيادة الإنتاج واختبار الوزن. يحسن محتوى البروتين في إنتاج المحصول.	تمزج مع مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات في التطبيقات التي تعمل بعد ظهور الأوراق الأولى للتخفيف من حدة التوتر التي تلحق المحصول.	

التحذيرات

تجنب تطبيق المنتج في الماء عند الرقم الهيدروجيني أكبر من 10.

عدم تطبيق المنتوج مع درجات حرارة عالية (< 30 درجة مئوية). ويمكن مزجه مع معظم الأسمدة التي ترش على الأوراق والمبيدات الحشرية.

لا تخلط مع الزيوت والكبريت والمشتقات المتترنة نوع من المبيدات أو منظمات النمو النباتية إذا كان لديك أي خبرة.

فمن غير المستحسن لمزجها مع "DIERANT أكثر من اثنين من المنتجات، حتى إذا كانت متوافقة.

فمن المستحسن لجعل التوافق برهان الأولي.

التخزين

مخزن في الحاوية الأصلية في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية و 30 درجة مئوية .

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة دراسات ومتعمقة والاختبار الدقيق. ومع ذلك، قد تحدث عدة عوامل خارجة عن سيطرتنا خلال الاستعمال (المخاليط، وتطبيق، والمناخ، وما إلى ذلك) تضمن الشركة التركيبة والصياغة والمحتوى. يكون المستخدم مسؤولا كليا أو جزئيا تلف لعدم مراعاة تعليمات الورقة التقنية.

SPECIMEN