

PALIO

**Palio**



**PALIO**

**DOMA LE GRAMINACEE CON PALIO**

Scopri i vantaggi di PALIO, **il nuovo graminiacida selettivo per il grano tenero e duro**

**Efficace anche su infestanti a foglia larga di difficile controllo**, PALIO è il tuo nuovo partner per il diserbo di post-emergenza

**NOVITÀ!**  
DISERBO CEREALI



**SIPCAM**  
ITALIA

# GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA PER IL DISERBO DEL FRUMENTO


**PALIO** è il nuovo graminicida di post-emergenza per il frumento tenero e duro, contenente **Pyroxsulam**. È efficace sulle principali infestanti a foglia stretta: avena, loietto, falaride, bromo e coda di volpe. **PALIO** possiede anche un'ottima attività su alcune foglie larghe: attaccamani, viola, veronica, geranio e camomilla, in combinazione con altri erbicidi a diverso meccanismo d'azione.

## MODALITÀ D'AZIONE

**PALIO**, assorbito per via fogliare e radicale, e traslocato anche verso le nuove foglie, porta al progressivo appassimento dell'infestante, la cui crescita viene rallentata subito dopo l'applicazione. Il completo controllo avviene nell'arco di 2/3 settimane dal trattamento.

## PUNTI DI FORZA

- **Graminicida efficace** anche su **infestanti difficili a foglia larga**, quali Veronica e Viola
- **Selettivo su frumento**
- **Miscibile** con tutti i principali dicotiledonici
- **Sistemico e attivo anche in occasione di piogge** cadute un'ora dopo dall'applicazione



## SCHEDA PRODOTTO

<b>Composizione</b>	Pyroxsulam 7,5%, Cloquintocet mexyl 7,5% (antidoto)
<b>Formulazione</b>	Granuli idrodispersibili (WG)
<b>Meccanismo di azione</b>	Gruppo HRAC: 2 (B)
<b>Colture e dosi d'impiego</b>	Frumento tenero e duro: 250 g/ha
<b>Fasi d'intervento</b>	Da accestimento a primo nodo del frumento, su infestanti ai primi stadi di sviluppo. Al fine di ottimizzare l'azione graminicida è necessario aggiungere POWERSHUT o un bagnante a base di sale sodico di alchilettere solfato
<b>Confezione</b>	500 g (x10)
<b>N° di registrazione</b>	17455 del 12/09/2019

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione. Si raccomanda un intervallo minimo di 4 mesi dopo l'applicazione per colture sensibili quali leguminose.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



**SIPCAM**  
ITALIA