



SHALLOW è un erbicida sistemico di post-emergenza efficace sulle infestanti a **foglia stretta** annuali e perenni.

Grazie all'esclusiva **tecnologia Isolink®**, **SHALLOW** è formulato in una singola emulsione, nella quale ogni micro-goccia contiene la sostanza attiva, i bagnanti e i penetranti nelle giuste proporzioni.



Performance rafforzate grazie alla formulazione ISOLINK®



I VANTAGGI DELLA FORMULAZIONE ISOLINK



Formulazione fortemente concentrata



Rapida penetrazione del prodotto nelle cuticole delle foglie



Ripartizione omogenea delle goccioline massimizzando l'area coperta

COME AGISCE

SHALLOW penetra rapidamente la cuticola fogliare e trasloca per via acropeta e basipeta verso gli apici vegetativi. La malerba arresta la sua crescita in 1-2 giorni dall'applicazione e in 3-4 settimane viene completamente devitalizzata.

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego
- Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 L di SHALLOW ogni 100 L d'acqua)
- Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress
- Non superare le dosi complessive di 2,5 l/ha per anno sullo stesso appezzamento

DOSI DI IMPIEGO (l/ha) E COLTURE

2 - 2,5	<i>Agropyron repens</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , Sorghetta da rizoma
1,25 - 2	Graminacee a nascita primaverile (<i>Echinochloa spp.</i> , <i>Setaria spp.</i> , <i>Digitaria spp.</i>) fino a inizio accestimento
1 - 1,25	Graminacee a nascita autunnale (<i>Lolium spp.</i> , <i>Alopecurus spp.</i>) fino a inizio accestimento
0,75 - 1	Graminacee a nascita autunnale (<i>Avena spp.</i> , <i>Phalaris spp.</i> , <i>Bromus spp.</i> e ricacci di frumento e orzo) fino a inizio accestimento

ARBOREE

Agrumi, Vite, Pomacee, Drupacee,
Frutta a guscio, Olivo



INDUSTRIALI

Patata, Pomodoro, Barbabietola da zucchero
e da foraggio, Girasole, Soia, Colza



ORTICOLE

Lattughe e altre insalate, Spinacio, Carciofo, Sedano, Cipolla,
Aglio, Scalogno, Porro, Finocchio, Cetriolo, Cetriolino,
Peperone, Melanzana, Carota, Cicoria, Asparago,
Cardo, Rabarbaro, Salsefrica, Rapa, Rutabaga, Ravanello,
Barbaforte, Pastinaca, Fagiolo, Pisello, Favetta, Lupino



FLOREALI

Rosa, Garofano, Liliacee, Bulbose, Gerbera,
Geranio, Viola, Petunia, Crisantemo, Strelizia



ALTRO

Fragola, lampone, mora, ribes, azzeruolo,
radici di erbe per infusi, erbe aromatiche.
Grano saraceno. Terreni incolti e in assenza di coltura.



SCHEDA PRODOTTO

Composizione	Fluazifop-P-butile, 125 g/l
Formulazione	EC (IsoLink®)
Meccanismo di azione	HRAC I
Fasi d'intervento	Prima dell'accestimento dell'infestante Sorghetta da rizoma: da trattare ad un'altezza di 30-50 cm
Confezione	1 L (x12); 10L (x2)
N° di registrazione	17743 del 4/12/2020