

HF Calibra



HF CALIBRA

PIÙ CHE UN RACCOLTO, UN CAPOLAVORO



Fitoregolatore auxinico a base di Fenotiol, principio attivo esclusivo del gruppo Sipcam Oxon, per l'aumento della pezzatura e il potenziamento dei processi di maturazione.




SCOPRI SUL SITO

sipcam.com


SIPCAM
ITALIA

FENOTIOL è un principio attivo registrato dal gruppo **Sipcam Oxon**. La categoria di riferimento, nell'ambito dei fitoregolatori, è quella delle "**AUXINE**", in particolare delle **tioauxine**.

HF CALIBRA si differenzia da altri fitoregolatori per la presenza dello zolfo e di coadiuvanti/coformulanti che lo rendono perfettamente selettivo e sicuro sulle colture registrate e per l'operatore.



i VANTAGGI di

HF Calibra

Efficace entro pochi giorni dall'applicazione

Aumenta il calibro dei frutti in modo omogeneo

Anticipa la maturazione dei frutti e ne **migliora la colorazione**

Alle dosi maggiori, su arancio e mandarino, produce un **effetto anticascola**

Rallenta l'attività di allungamento dei getti estivi contenendo lo sviluppo delle varietà vigorose

Ha **bassissima residualità** e non ha tempo di carenza (7 gg. su arance solo se applicato alle dosi maggiori per effetto anticascola)

È perfettamente miscibile con la quasi totalità dei prodotti agrofarmaci e nutrizionali e non è fitotossico

SCHEMA PRODOTTO

Composizione	Fenotiol g 2 (20 g/l) Coformulanti e inerti: quanto basta a..... g 100
Formulazione	Concentrato solubile (SL)
Meccanismo di azione	Regolatore della crescita, appartenente alla famiglia delle tioauxine, formulato con attivatori e penetranti per veicolare verso i frutticini in fase di ingrossamento acqua, elementi nutritivi e fotosintetati, accrescendone così le dimensioni e accelerandone i processi di maturazione
Colture e dosi di impiego	Arancio e mandarino: 50-125 ml/hl; (100-200 ml/hl in funzione anticascola), melo: 75-150 ml/hl, pescio e nettarine: 75-125 ml/hl, albicocco e susino: 100-150 ml/hl, avocado: 75-100 ml/hl, kiwi: 150-200 ml/hl
Fasi di impiego	Arancio: da caduta petali fino a 30 mm di diametro, mandarino: da caduta petali fino a 15-20 mm, pescio, nettarino, susino e albicocco: in fase di indurimento del nocciolo, melo in fase di ingrossamento del frutto fino a 1 mese dalla raccolta, avocado: 1-2 volte per stagione, la prima alla ripartenza della gemmazione e la seconda 15-20 giorni dopo, kiwi: a 21-28 giorni dopo la piena fioritura (che si verifica quando circa il 50% dei fiori sono aperti e cadono i primi petali)
Numero di registrazione	17034 del 13.11.2017 modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R.n.55/2012 con validità dal 13 gennaio 2025