


GUÍA

Viña



FEBRERO - MARZO - ABRIL		MAYO - JUNIO		JULIO		AGOSTO- SEPTIEMBRE	
B1: LLORO B2: BROTACIÓN	C: PUNTA VERDE G: RACIMOS SEPARADOS	H: BOTONES FLORALES SEPARADOS I1: INICIO FLORACIÓN	I2: PLENA FLORACIÓN J: CUAJADO FRUTO	K: GRANO TAMAÑO GUISANTE	L: CIERRE DE RACIMO	M1: INICIO DE ENVERO	N: MADURACIÓN
BRIXTON							
VOLCAN							
MIZUKI							
RIPPER				RIPPER			
MOST MICRO HL							
		FLASH UM					
		MITACID PLUS					
				FLASH UM			
				MITACID PLUS			
						EPIK	
EPIK							
FAKIR EC							
		FAKIR EC		FAKIR EC			
		ARAW		ARAW			
SHINKON		MIKONOS	MIKONOS	MIKONOS	LIETO	LIETO	
LIETO		LIETO	LIETO	LIETO	SHINKON	SHINKON	
		XANILO DUO PACK	XANILO DUO PACK	SHINKON	XANILO 45 WG	XANILO 45 WG	
				XANILO 45 WG			
DOMARK EVO		SUFREVIT	SUFREVIT	SUFREVIT	ARAW	SUFREVIT	
		ARAW	GUANTE 500	GUANTE 500	GUANTE 500	ARAW	
						GUANTE 500	
BLACKJAK		ABYSS	ABYSS	RECORD			
TONOFOL Mg		FLORAMIN CUAJE	FLORAMIN CUAJE	TONOFOL Mg			
MAGNOFOL		INABOR	BLACKJAK	LIQUI-K			
INABOR		TONOFOL Mg	TONOFOL Mg	STILO HYDRO			
				RECORD	STILO HYDRO L		
				STILO HYDRO			
STILO MICRO REMOVER + BLACKJAK	BLACKJAK	BLACKJAK	RECORD	BLACKJAK	BLACKJAK	BLACKJAK	
	PERFECTOSE			LIQUI-K EXPRESS	RECORD	LIQUI-K EXPRESS	
TYRIS					LIQUI-K EXPRESS		
FERRALE EVO							

FEBRERO - MARZO - ABRIL

B1 - LLORO
B2 - BROTACIÓN



HERBICIDAS

Post-emergencia

BRIXTON: 1,33 l/ha
VOLCAN: 0,8 l/ha*
MIZUKI: 2 l/ha*
RIPPER: 2 l/ha*

Pre-emergencia

MOST MICRO HL: 3 l/ha

*Superficie real tratada

INSECTICIDAS

Trips

EPIK: 0,25-0,3 kg/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación Radicular

STILO MICRO REMOVER: 2 kg/ha
+
BLACKJAK: 4 l/ha

TYRIS: 2 l/ha

FERRALE EVO: 5-10 g/cepa

OBSERVACIONES

- STILO MICRO REMOVER: Para mitigar la falta de vigor, mejorar conducción de savia y aumentar la resistencia al estrés hídrico y térmico.
- BLACKJAK: Mejora de la estructura del suelo y estimulación de la microbiota del mismo.
- FERRALE EVO: Para carencias de Hierro.
- TYRIS: Para fomentar el desarrollo radicular en la brotación.

C - PUNTA VERDE
G - RACIMOS SEPARADOS



HERBICIDAS

Post-emergencia

BRIXTON: 1,33 l/ha
VOLCAN: 0,8 l/ha*
MIZUKI: 2 l/ha*
RIPPER: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

INSECTICIDAS

Ácaros

FLASH UM: 1 l/ha
MITACID PLUS: 1,2 l/ha

Piral

FAKIR EC: 60 ml/hl

Trips

EPIK: 0,25-0,3 kg/ha

FUNGICIDAS

Mildiu

SHINKON: 0,375 l/ha
LIETO: 0,4 kg/ha

Oídio

DOMARK EVO: 0,24 l/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación Foliar

BLACKJAK: 1-1,5 l/ha
TONOFOL Mg: 0,3 kg/hl
MAGNOFOL: 0,3-0,6 l/hl
INABOR: 1-2 l/ha

Aplicación Radicular

BLACKJAK: 4 l/ha
PERFECTOSE: 10 l/ha

OBSERVACIONES

- VOLCAN y MIZUKI: Para el control de dicotiledóneas, juncias en estados iniciales y rebrotes.
- RIPPER: Para el control total de malas hierbas y rebrotes.
- BLACKJAK: En aplicación foliar, potencia la acción de los nutrientes y correctores. Activa la cepa.
- TONOFOL Mg: Corrección carencias de Magnesio y aporte de Calcio.
- MAGNOFOL: Corrección carencias de Magnesio y aporte de Zinc.
- BLACKJAK y PERFECTOSE: En aplicación radicular, corrige la falta de vigor.

MAYO - JUNIO

H - BOTONES FLORALES SEPARADOS
I1 - INICIO FLORACIÓN



HERBICIDAS

Post-emergencia

BRIXTON: 1,33 l/ha
VOLCAN: 0,8 l/ha*
MIZUKI: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

INSECTICIDAS

Polilla

FAKIR EC: 60 ml/hl

Trips

EPIK: 0,25-0,3 kg/ha

FUNGICIDAS

Mildiu

MIKONOS: 2,5 l/ha
LIETO: 0,4 kg/ha
XANILO DUO PACK:
1-1,5 l - 0,25 kg/ha

Oídio

SUFREVIT: 2-5 l/ha
ARAW: 2,5 l/ha

Botritis

ARAW: 2,5 l/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación foliar

ABYSS: 1-1,5 l/ha
FLORAMIN CUAJE: 1 l/ha
INABOR: 2 l/ha
TONOFOL Mg: 0,3 kg/hl

Aplicación radicular

BLACKJAK: 4 l/ha

OBSERVACIONES

Todo el planteamiento nutricional va dirigido al cuajado en orden de eficacia, aplicar solamente uno de ellos.

- ABYSS: Favorece la producción de flores y las protege de situaciones de estrés.
- INABOR: Aplicar previo a la floración si no se ha aplicado en brotación.
- FLORAMIN CUAJE: Para aumentar la tasa de cuajado de los frutos.
- BLACKJAK: Mejora de la estructura del suelo, mejora de la retención de agua en suelo ligeros.

I2 - PLENA FLORACIÓN
J - CUAJADO FRUTO



HERBICIDAS

Post-emergencia

BRIXTON: 1,33 l/ha
VOLCAN: 0,8 l/ha*
MIZUKI: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

FUNGICIDAS

Mildiu

MIKONOS: 2,5 l/ha
LIETO: 0,4 kg/ha
XANILO DUO PACK:
1-1,5 l - 0,25 kg/ha

Oídio

SUFREVIT: 2-5 l/ha
GUANTE 500: 0,5 l/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación foliar

ABYSS: 1-1,5 l/ha
FLORAMIN CUAJE: 1 l/ha
BLACKJAK: 1-2,5 l/ha
TONOFOL Mg: 0,3 kg/hl
RECORD: 0,2-0,3 l/hl
STILO HYDRO: 1-2 kg/ha
STILO HYDRO L: 2-4 l/ha

Aplicación radicular

RECORD: 3-5 l/ha

OBSERVACIONES

- ABYSS: Mejora el cuajado de las bayas y fomenta su multiplicación celular.
- FLORAMIN CUAJE: Aumenta la tasa de cuajado de las bayas.
- BLACKJAK: Induce el alargamiento del raspón y estimula el crecimiento.
- TONOFOL Mg: Corrige las carencias de Magnesio y aporte de Calcio.
- RECORD: En aplicación foliar, facilita la asimilación de Calcio y mejora la estructura de la pared celular.
- STILO HYDRO y STILO HYDRO L: Para evitar corrimiento de bayas en situaciones de climatología adversa.
- RECORD: En aplicación radicular, mejora la absorción y translocación de los nutrientes.

JULIO

K - GRANO TAMAÑO GUISANTE



HERBICIDAS

Post-emergencia

BRIXTON: 1,33 l/ha
VOLCAN: 0,8 l/ha*
MIZUKI: 2 l/ha*
RIPPER: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

INSECTICIDAS

Polilla

FAKIR EC: 60 ml/hl

Araña y Mosquito Verde

FLASH UM: 1 l/ha
MITACID PLUS: 1,2 l/ha

FUNGICIDAS

Mildiu

MIKONOS: 2,5 l/ha
LIETO: 0,4 kg/ha
SHINKON: 0,375 l/ha
XANILO 45 WG: 0,27 kg/ha

Oídio

SUFREVIT: 2-5 l/ha
GUANTE 500: 0,5 l/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación Foliar

RECORD: 0,2-0,3 l/hl
TONOFOL Mg: 0,3 kg/hl
LIQUI-K: 0,13-0,2 l/hl
STILO HYDRO: 1-2 kg/ha
STILO HYDRO L: 2-4 l/ha

Aplicación Radicular

BLACKJAK: 2-4 l/ha
LIQUI-K EXPRESS:
3-4 kg/ha

OBSERVACIONES

- RECORD: Endurecimiento del hollejo.
- TONOFOL Mg: Corrección de carencias de Magnesio y aporte de Calcio.
- LIQUI-K o LIQUI-K EXPRESS: Corrección carencias de Potasio y aumento de azúcares.
- STILO HYDRO y STILO HYDRO L: recuperadores de estrés térmico e hídrico.
- BLACKJAK: Favorece la activación vascular de la cepa.

L - CIERRE DE RACIMO



HERBICIDAS

Post-emergencia

BRIXTON: 1,33 l/ha
VOLCAN: 0,8 l/ha*
MIZUKI: 2 l/ha*
RIPPER: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

INSECTICIDAS

Polilla

FAKIR EC: 60 ml/hl

Araña y Mosquito Verde

FLASH UM: 1 l/ha
MITACID PLUS: 1,2 l/ha

Cochinillas y Mosquito Verde

EPIK: 0,25-0,3 kg/ha

FUNGICIDAS

Mildiu

LIETO: 0,4 kg/ha
SHINKON: 0,375 l/ha
XANILO 45 WG: 0,27 kg/ha

Oídio

ARAW: 2,5-3 l/ha
GUANTE 500: 0,5 l/ha

Botritis

ARAW: 2,5 l/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación Radicular

BLACKJAK: 2-4 l/ha
RECORD: 3-5 l/ha
LIQUI-K EXPRESS:
3-4 kg/ha

OBSERVACIONES

- BLACKJAK: Mejorador de la estructura del suelo y retención hídrica.
- RECORD: Endurecimiento del hollejo.
- LIQUI-K EXPRESS: Corrección de carencias de Potasio y aumento de azúcares.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

M1 - INICIO DE ENVERO



HERBICIDAS

Post-emergencia

VOLCAN: 0,8 l/ha*

MIZUKI: 2 l/ha*

RIPPER: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

INSECTICIDAS

Polilla

FAKIR EC: 60 ml/hl

FUNGICIDAS

Mildiu

LIETO: 0,4 kg/ha

SHINKON: 0,375 l/ha

XANILO 45 WG: 0,27 kg/ha

Oídio

SUFREVIT: 2-5 l/ha

ARAW: 3-3,5 l/ha

GUANTE 500: 0,5 l/ha

Botritis

ARAW: 3-3,5 l/ha

NUTRICIÓN Y/O BIOESTIMULACIÓN

Aplicación Foliar

LIQUI-K: 0,13-0,2 l/hl

Aplicación Radicular


BLACKJAK: 2-4 l/ha

LIQUI-K EXPRESS:
3-4 kg/ha

OBSERVACIONES

- BLACKJAK: Mejora la estructura del suelo y aumenta la retención hídrica.
- LIQUI-K o LIQUI-K EXPRESS: Corrigen las carencias de Potasio y aumentan el contenido en azúcares, asegurando un buen agostamiento del sarmiento.

N - MADURACIÓN



HERBICIDAS

Post-emergencia

VOLCAN: 0,8 l/ha*

RIPPER: 2 l/ha*

*Superficie real tratada

FUNGICIDAS

Botritis

ARAW: 3-3,5 l/ha

OBSERVACIONES

- VOLCAN: Usar siempre con boquillas antideriva y adicionar algún aceite de colza o soja que limite la deriva y la formación de gotas pequeñas.
- MIZUKI: Se recomienda el uso de boquillas antideriva. NO es necesario adicionar aceite o mojante.
- ARAW, por sus características se puede aplicar hasta 3 días antes de la cosecha en uva de vinificación si se dan condiciones favorables para la botritis.
- Aplicaciones herbicidas postcosecha en caso de haber malas hierbas.



sipcam.com/es