

ABYSS®
EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO
Abono hidrosoluble

CONTENIDO DECLARADO:

Ácido algínico	1,8%
Manitol	1%

pH (100%): 4,5

Conductividad eléctrica: 24 dS/m

Contiene extracto de algas *Ascophyllum nodosum* 100%.

Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

®Marca registrada por SIPCAM OXON S.p.A.



Masa Neta: kg
Contenido: litros
Lote: Ver envase

**ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO**

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños
- P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización

Contiene conservantes (biocidas), cumpliendo con RD 506/2013 y Reglamento 528/2012

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME
AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420.**

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: EG7V-GDGS-GV02-JGPF

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**CARACTERÍSTICAS**

ABYSS® es un extracto puro, de pH ácido, de algas del género *Ascophyllum nodosum* cosechadas cerca de la costa irlandesa, en las aguas cristalinas del Atlántico Norte. Se obtiene mediante un proceso de extracción en frío patentado, con ultrafiltración, por lo que conserva inalterados todos los componentes activos de las algas. Este exclusivo proceso de extracción a baja temperatura, efectuado a las pocas horas de la recolección, elimina el residuo de cloruro de la matriz, optimizando la solubilidad y miscibilidad del producto.

ABYSS® contiene una alta concentración de compuestos de origen natural: carbohidratos (manitol y alginatos con acción quelante y osmorreguladora) y aminoácidos esenciales.

El uso de **ABYSS®** es ideal tanto en cultivos arbóreos como herbáceos en todas las fases del ciclo de los cultivos. Por su específica composición se recomienda su aplicación desde la proximidad de la floración hasta el inicio de la maduración.

Mediante aplicación foliar, **ABYSS®** induce y mejora todos los procesos fisiológicos de la planta (floración, fructificación, crecimiento de los frutos, absorción de los elementos nutritivos, desarrollo de los brotes), al mismo tiempo que favorece una mayor resistencia al estrés abiótico.

ABYSS® aplicado en fertirrigación mejora el desarrollo del aparato radicular de la planta durante todo el ciclo vegetativo, optimizando la absorción de nutrientes y de agua.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Dosis (l/ha)	Época	Nº aplicaciones (Intervalo)
Aplicación foliar			
Cereales, cultivos oleaginosos e industriales	0,5-1	En prefloración	1-2 (10-15 días)
Hortícolas de fruto y de hoja (aire libre)	1-1,5	En las primeras etapas del desarrollo del cultivo cuando la planta presenta 2-3 hojas y ya está enraizada	2-3 (10-15 días)
Hortícolas de bulbos o tubérculos	0,75-1,5	Primera aplicación cuando el cultivo presenta 2-3 hojas	2-3 (10-15 días)
Hortícolas en invernadero	1-2	Cuando el cultivo ya está enraizado, en prefloración, cuajado y fases del desarrollo del fruto	3-4 (7-10 días)
Frutales de hueso y de pepita	0,75-1,5	Comienzo de la brotación de primavera, prefloración, cuajado y fases del desarrollo del fruto	3-4 (10-15 días)
Uva de vinificación	0,75-1,5	Prefloración y postcuajado	3-4 (7-10 días)
Uva de mesa	1-2	Prefloración, postcuajado y desarrollo de frutos	3-4 (7-10 días)
Kiwi	0,75-1,5	De prefloración a engrosamiento de los frutos	3-4 (7-10 días)
Cítricos	1-2	Comienzo de la brotación de primavera, prefloración, cuajado y fases del desarrollo del fruto	3-4 (10-15 días)
Olivo	1-2	Comienzo de la brotación de primavera, prefloración, cuajado y fases del desarrollo del fruto	3-4 (10-15 días)
Nogal	1	De prefloración a engrosamiento de los frutos	3-4 (7-10 días)
Césped Plantas ornamentales	1-2	Durante el ciclo vegetativo	4-5 (14 días)
Otros cultivos y durante periodos de estrés	1-2	Durante el ciclo vegetativo y en previsión o para superación de heladas, sequía o granizadas	3-4 (14 días)

Aplicación a la raíz			
Todos los cultivos	2-4	Aplicaciones repetidas desde la primera fase vegetativa	2-3 (14 días)

PRECAUCIONES

ABYSS® es compatible con los productos fitosanitarios y/o fertilizantes presentes en el mercado, pero dada la amplia variedad de productos, es conveniente, en caso de mezcla, efectuar una prueba preventiva de compatibilidad sobre una pequeña superficie.

No mezclar con productos que contengan calcio o magnesio.

En los cultivos en los que se recomienda, dada la gran cantidad de variedades existentes, se efectuará un ensayo preliminar antes de realizar el tratamiento en una amplia superficie.

Evitar las aplicaciones en mezcla con ácidos fuertes (como p. ej. ácido ortofosfórico o ácido nítrico). En caso de mezcla con productos a base de calcio, realizar una primera dilución de **ABYSS®** en agua (concentración máx. del 20%) y después incorporar a la solución los productos a base de calcio.

Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados, entre 4 y 25°C, a resguardo de las fuentes de calor y de la exposición al sol.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.