



CURANE® EVO

Curane® EVO



CURANE® EVO

EL LÍDER
DE TU DEFENSA

- Fungicida sistémico, con movimiento ascendente y descendente.
- Alta protección de zonas en crecimiento activo.
- Activador de las autodefensas de las plantas.
- Rápida absorción.

Curane® Evo

¿QUÉ ES?

CURANE® EVO es un FUNGICIDA SISTÉMICO a base de Fosfonato Potásico con elevado efecto frente a hongos Oomicetos (Mildiu, *Phytophthora*, *Phythium*, *Bremia*,...). Está formulado como Concentrado Soluble (SL).

MATERIA ACTIVA	Fosfonato potásico (expresado como ácido fosforoso) 51% p/v (510 g/l) Equivalente a 790 g/l de mezcla de fosfonatos potásicos
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
REGISTRO	ES-00302

¿CÓMO ACTÚA?

CURANE® EVO actúa inhibiendo la germinación de las esporas reproductoras del hongo. Además, induce la producción de FITOALEXINAS (sustancias de defensa naturales de las plantas).

CARACTERÍSTICAS

- Sistemia ascendente y descendente.
- Protección eficaz de las zonas en crecimiento activo.
- Clasificado dentro del Grupo FRAC P 07 (inductores de las defensas naturales en la planta huésped).
- No favorece la aparición de resistencias.
- Efecto sinérgico: aplicado en mezcla con otros fungicidas refuerza la eficacia del tratamiento.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS DE CURANE® EVO

Cultivo	Enfermedad	Dosis l/ha	Número aplicaciones	Intervalo (días)	Volumen caldo (l/ha)	Forma y época de aplicación (condiciones específicas)
Vid (aire libre)	<i>Phytophthora</i>	0,75 - 2,5	3	10	500 - 1000	Incluye vid de mesa y vinificación. Aplicar a partir de BBCH>20, es decir, a partir del final del desarrollo de las hojas y aparición de las inflorescencias.

CURANE® EVO también está registrado para su uso en:

Naranjo/Pomelo (aire libre), Olivo (aire libre), Aguacate (aire libre), Caqui (aire libre), Piña tropical (aire libre), Arbustos frutales (aire libre), Berenjena (invernadero), Fresal (invernadero), Frambueso y zarzamoras (aire libre), Hierbas aromáticas y flores comestibles (aire libre), Lechuga y similares (aire libre), Patata (aire libre), Pimiento (invernadero) y Tomate (invernadero).

No se recomienda mezclar con aceites ni aplicar sobre cultivos en los que se han aplicado formulados a base de aceites, porque evitaría la penetración del producto en la planta.

POSICIONAMIENTO TÉCNICO EN VID DE VINIFICACIÓN Y UVA DE MESA

Para el control de mildiu se recomienda:

- Aplicar a partir de BBCH>20, es decir, a partir del final del desarrollo de las hojas y la aparición de las inflorescencias.
- Emplear dosis de 2 a 2,5 l/ha.
- Para aumentar eficacia del tratamiento, aplicar junto a otros productos con modo de acción por contacto y/o penetrante.

