

INAFOL® BROTACIÓN**ABONO NPK (S) 24-12-12 (10) CON MICRONUTRIENTES**
Polvo Soluble en Agua (SP)**CONTENIDO DECLARADO:**

Nitrógeno (N) total		24%
Nitrógeno (N) amoniacal	2%	
Nitrógeno (N) ureico	22%	
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y agua	12%	
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua		12%
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	12%	
Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua	12,5%	
Boro (B) soluble en agua	1,0%	
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,05%	
Zinc (Zn) soluble en agua	0,05%	

Pobre en cloruros

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca registrada por Sipcam Inagra, S.A.

Masa Neta: kg**Lote:** Ver envase**ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA****A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**

**PELIGRO**

- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene Sulfato de potasio ($10\% < \text{KHSO}_4 < 15\%$) (CAS:7778-80-5); Octaborato de disodio $4\text{H}_2\text{O}$ (CAS:12280-03-4)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

UFI: KPF0-QT9Q-4K57-J1JQ

GESTIÓN DE ENVASES:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**CARACTERÍSTICAS**

INAFOL® BROTAÇÃO es un abono NPK compuesto, de aplicación foliar, especialmente indicado para la corrección o prevención de los estados carenciales asociados a los momentos de máximo desarrollo vegetativo o bien de una inadecuada absorción de estos elementos, en cultivos ornamentales y florales, olivo, frutales, hortalizas, cítricos y cultivos industriales.

El aporte de **INAFOL® BROTAÇÃO** prepara la planta para una óptima brotación y floración, mejorando los brotes producidos, fortalece la planta ante alteraciones fisiológicas y climatológicas y genera una mejor respuesta a todo tipo de tratamientos fitosanitarios.

El producto **INAFOL® BROTAÇÃO** incorpora Magnesio en su formulación, elemento fundamental para la vida de la planta por ser un constituyente de excepción en la clorofila y, por tanto, para el proceso de fotosíntesis.

DOSIFICACIÓN

Se recomienda su aplicación por vía foliar en brotación a dosis de 0,4 – 0,6% (400 – 600 g/hl).

En aplicaciones a bajo volumen deberá aumentarse la dosis en la misma proporción que se reduzca el consumo de agua o caldo de pulverización empleado.

MODO Y ÉPOCA DE EMPLEO

INAFOL® BROTACIÓN puede aplicarse durante cualquier época del año, pero su momento idóneo de aplicación es durante los momentos de brotación, hasta pre-floración, con el objetivo de estimular el crecimiento. En cultivos florales y hortícolas es recomendable realizar aplicaciones durante todo el ciclo de cultivo.

INAFOL® BROTACIÓN puede ser añadido a los caldos de pulverización de productos fitosanitarios para reducir costos y mejorar sus efectos.

CONSEJOS E INCOMPATIBILIDADES

No aplicar con altas temperaturas ($\geq 30^{\circ}\text{C}$). Se puede mezclar con la mayoría de abonos foliares y fitosanitarios. No mezclar con aceites o azufre ni con más de dos productos distintos, aunque sean compatibles. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.