

MIKONOS®

**Mikonos®**



**MIKONOS®**

**VENCE A LOS GIGANTES**

- Fungicida preventivo y curativo totalmente sistémico.
- Rápida absorción con movimiento ascendente y descendente.
- Alta protección de las zonas en crecimiento activo.
- Activador de las defensas de la planta.

[sipcamiberia.es](http://sipcamiberia.es)

  
**SIPCAM**  
IBERIA

# Mikonos®

## ¿QUÉ ES?

MIKONOS® es un **fungicida sistémico con acción preventiva y curativa** que actúa frente a hongos como *Mildiu*, *Phytophthora*, *Bremia*, Repilo, ... y activa el sistema inmunitario de la planta.

Nº de Registro: ES-01462

## ¿CÓMO ACTÚA?

MIKONOS® tiene sistemía vía xilema y floema por lo que va a proteger al cultivo en su continuo crecimiento, ya que:

- Actúa directamente sobre el patógeno impidiendo su desarrollo.
- Cesa la actividad infecciosa al bloquear los procesos de transferencia de energía del hongo, inhibe la germinación de esporas.
- Induce la producción de fitoalexinas, activando las defensas de la planta, fortaleciendo las paredes de las células y produciendo proteínas de defensa.
- Presenta una gran sinergia con la acción de otros fungicidas con los que se pueda aplicar en estrategia, reforzando el tratamiento.
- Su uso dificulta la aparición de resistencias.

## USOS Y DOSIS AUTORIZADOS DE MIKONOS®

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	N.º Máx Aplic	Forma y época de aplicación (condiciones específicas)	P.S.
Mandarino (incluido clementino e híbridos) Limonero Lima	<i>Phytophthora spp.</i>	1,5 – 8,75	2	Aplicar desde BBCH 40	15
Olivo (Aceituna de mesa y producción de aceite)	Repilo del olivo	1,2 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 11-81	15
Aguacate	Podredumbre de cuello y raíz	0,75 – 3,75	3	Aplicar durante BBCH 59-67 o bien BBCH 71-85	15
Caqui	Alternariosis de la remolacha	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 76-89	20
Tomate y Berenjena (invernadero)	Mildiu de la patata y el tomate	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 12-89	15
Pimiento (invernadero)	<i>Phytophthora spp.</i>	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 12-89	15
Fresal (invernadero: incluido microtúnel y walk-in tunnel)	<i>Phytophthora spp.</i>	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 12-85	7
Zarzamoras Frambueso Arándano, mirtilo Grosellero (aire libre)	<i>Phytophthora spp.</i>	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 33-69	7
Lechuga y similares	Mildiu de la lechuga ( <i>Bremia</i> )	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 12-49	15
Patata	Mildiu de la patata y el tomate	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 12-49	15
Piña Tropical	Podredumbre de cuello y raíz Mildiu terrestre del tomate	4,5 – 6	2	Aplicar durante BBCH 10-79	30
Vid de vinificación	Mildiu de la vid	0,75 – 2,5	3	Aplicar desde BBCH 20	15

### USOS MENORES: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51.5 Reglamento (CE) 1107/2009)

Achicoria (hojas)*, Barbarea*, Berro mastuerzo*, Brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica)*, Canónigo*, Diente de león*, Escarola*, Mostaza china*, Rúcula* (aire libre)	Mildiu de la lechuga ( <i>Bremia</i> )	0,45 – 2,5	3	Aplicar durante BBCH 12-49	15
Albahaca*, Apio*, Cebollino*, Estragón*, Laurel*, Perejil*, Perifollo*, Romero*, Salvia*, Tomillo* (aire libre)					

\*La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.