

MOST MICRO HL
Herbicida
Suspensión de Cápsulas (CS)

COMPOSICIÓN

Pendimetalina ... 36,5% p/v (365 g/l)

Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

La nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 25.730

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

sipcam.com/es

Titular y fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

CONTENIDO NETO : VER ENVASE

LOTE DE FABRICACIÓN : VER ENVASE

FECHA DE FABRICACIÓN : VER ENVASE


ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO PROFESIONAL AGRARIO

**USO PROFESIONAL NO AGRARIO EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN
GENERAL**

AGÍTESE ANTES DE USAR

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO**

**ATENCIÓN**

- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H361d Se sospecha que puede dañar al feto.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) n° 547/2011).

Medidas básicas de actuación:

- ✓ Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- ✓ En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- ✓ En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- ✓ En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- ✓ Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- ✓ Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: 15YY-GT82-530U-1VM0

Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo.

Además durante la aplicación (si el tractor no lleva cabina cerrada) y limpieza del equipo deberá utilizar ropa de protección química tipo 3 o 4 y calzado adecuado.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Mitigación de riesgos ambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



CARACTERÍSTICAS

MOST MICRO HL es un herbicida selectivo a base de pendimetalina para aplicación en preemergencia o postemergencia precoz contra malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas anuales.

APLICACIONES y MODO DE EMPLEO

Efectuar 1 tratamiento por campaña, aplicándolo al suelo en cultivos al aire libre en pulverización a baja presión en un volumen de caldo de 200 – 400 l/ha, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas, en los siguientes cultivos:

Cultivo	Dosis (l/ha)	Condicionamiento específico (Estado de crecimiento del cultivo)
Naranja, limonero y mandarino (incluido clementino e híbridos)	2,5-3	Aplicación dirigida entre las líneas del cultivo en preemergencia de las malas hierbas, en primavera u otoño. Evitar cualquier contacto con las partes verdes de los árboles
Vid, manzano, peral, melocotonero*, cerezo, albaricoquero, almendro, nogal y avellano	2,5-3	Aplicar en pulverización dirigida entre líneas, en invierno, antes del inicio del crecimiento de los brotes, en preemergencia de las malas hierbas
Tomate y pimiento	1,25-2,2	Aplicar en pretrasplante
Lechuga	1,5-2	Aplicar en pretrasplante
Cebolla y ajo	1-2,5	Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo (estado de 2-3 hojas)
Zanahoria	2-2,5	Aplicar en preemergencia del cultivo
Patata	1,7-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Girasol	2-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Trigo	1,7-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Maíz	2-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Judía para grano, judía verde, haba para grano, haba verde, guisante para grano, guisante proteaginoso/forrajero y guisante verde	1,7-2,5	Aplicar en preemergencia del cultivo
Algodonero	2-3	Aplicar en presiembra con incorporación o en preemergencia del cultivo
Tabaco	1,25-3	Aplicar en pretrasplante
Soja	2-2,5	Aplicar en preemergencia del cultivo
Ornamentales herbáceas	2,5-3	Aplicación dirigida entre las líneas del cultivo en preemergencia de las malas hierbas y en pretrasplante

* Se incluye el nectarino (*P. persica* var. *nucipersica*), el paraguayo (*P. persica* var. *platycarpa*) y otras variedades e híbridos asociados al melocotonero.

Malas hierbas gramíneas anuales sensibles:

Alopecurus myosuroides, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Panicum dichotomiflorum*, *Setaria viridis*, *Setaria verticillata*, *Poa annua*.

Malas hierbas anuales de hoja ancha sensibles:

Amaranthus retroflexus, *Amaranthus blitoides*, *Anagallis arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Cardamine hirsuta*, *Chenopodium album*, *Euphorbia* sp., *Polygonum persicaria*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum lapathifolium*, *Bilderdykia convolvulus*, *Portulaca*

oleracea, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Urtica urens, Veronica hederifolia, Veronica persica, Viola arvensis.

PRECAUCIONES

- ✓ Efectuar una buena preparación del lecho de siembra de forma que quede un terreno perfectamente nivelado.
- ✓ Realizar la siembra de forma uniforme y regular a una profundidad de al menos 3 cm para zanahoria y cebolla y de 4 cm para los restantes cultivos, evitando que algunas semillas queden descubiertas o en la superficie.
- ✓ Para cultivos donde se realiza trasplante (tomate, pimiento y tabaco), aplicar sobre el terreno bien preparado realizando posteriormente un ligero riego y esperar al menos 7-8 días para proceder al trasplante, tras el cual se efectuará otro ligero riego. En ningún caso se deben “recolocar” las plántulas (estirando la planta) antes de pasados 30 días desde la aplicación.
- ✓ En las aplicaciones en postemergencia, las malas hierbas deben estar en las primeras etapas del desarrollo (germinación de los cotiledones).
- ✓ Después de realizar la aplicación, lávese el equipo de pulverización y todas las herramientas utilizadas.
- ✓ Pueden sembrarse o plantarse otros cultivos transcurridos 6 meses desde la aplicación del producto, después de realizar una labor profunda (15-20 cm).
En el caso de realizar una resiembra en el terreno ya tratado, evitar el contacto de las nuevas semillas con el producto. Para ello, resembrar a la profundidad necesaria sin remover el suelo, o efectuar una labor profunda al menos de 20 cm, lo cual es necesario si en lugar de resembrar el cultivo tratado se prefiere sembrar remolacha azucarera.
- ✓ El uso del formulado resulta seguro cuando se aplica en muchos tipos diversos de plantas, arbustos y árboles. Sin embargo, no se ha investigado la selectividad en la totalidad de variedades e híbridos. Los efectos adversos tales como fitotoxicidad pueden ocurrir debido a las condiciones medioambientales, de crecimiento o por la forma de realizar la aplicación del tratamiento herbicida. Por tanto, es aconsejable, antes del uso generalizado del producto, realizar una prueba en un pequeño número de plantas y examinarlas transcurridos 1-2 meses para descartar síntomas de fitotoxicidad.
- ✓ No pulverizar en plántulas o plantas para trasplantar. No aplicar el formulado en plantas ornamentales en floración o con un crecimiento vegetativo vigoroso.
- ✓ Si no llueve transcurridos 7-10 días desde la aplicación, realizar un riego para facilitar la penetración del producto en la capa superficial del suelo.
- ✓ Las dosis más bajas se recomiendan cuando el tratamiento se realiza en suelos ligeros-bajo contenido en materia orgánica y/o con poca población de malas hierbas.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede establecer ningún plazo de seguridad.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.