

**PERFECTOSE®**  
**AMINOÁCIDOS PARA FERTIRRIGACIÓN**  
**ABONO HIDROSOLUBLE**  
**Concentrado Soluble (SL)**

**CONTENIDO DECLARADO:**

Aminoácidos libres 10,5% p/p  
Nitrógeno (N) total 6,60 % p/p  
Nitrógeno (N) orgánico 3,00 % p/p  
Nitrógeno (N) amoniacal 3,60 % p/p

**Aminograma:**

Ácido aspártico, Ácido glutámico (59% p/p), Alanina, Glicina, Prolina, Serina, Valina.

**pH 100%:** 6,20

**Densidad:** 1,205 kg/l

Proceso seguido en su obtención: aminoácidos obtenidos por fermentación de carbohidratos mediante *Corynebacterium*.  
Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

Distribuidor:

**SIPCAM IBERIA, S.L.**

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

**SIPCAM INAGRA, S.A.**

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca registrada por Sofbey Sarl

**Masa Neta:** kg  
**Contenido:** litros  
**Lote:** Ver envase

**ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA**  
**AGÍTESE ANTES DE USAR**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**



**ATENCIÓN**

- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P261 Evitar respirar los vapores.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280 Llevar guantes/prendas/protección respiratoria/gafas/calzado de protección.

- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene: 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona (CAS: 2682-20-4); 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS: 26530-20-1); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (CAS: 2634-33-5)

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta**

**UFI: Y5V7-K6C4-NK58-C8F8**

#### **GESTIÓN DE ENVASES:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



#### **CARACTERÍSTICAS**

**PERFECTOSE®** es un producto procedente de la fermentación de extractos vegetales que asegura un máximo contenido en Isómeros L, únicos aminoácidos biológicamente activos.

**PERFECTOSE®**, debido al elevado contenido en aminoácidos libres y su rápida incorporación a la savia elaborada, proporciona un medio nutritivo aprovechado de forma inmediata y efectiva por las plantas.

**PERFECTOSE®** favorece todos los procesos vegetativos: Crecimiento, inducción floral, cuajado y desarrollo de los frutos (ver en el cuadro de dosis y modo de empleo el apartado de “Efectos”).

**PERFECTOSE®**, está especialmente indicado para su uso en fertirrigación, pudiendo mezclarse con los fertilizantes habituales.

#### **PRECAUCIONES**

Evitar aplicar el producto en caldos de pH superior a 10. No aplicar con altas temperaturas ( $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ). Se puede mezclar con la mayoría de abonos foliares y fitosanitarios. No mezclar con aceites, azufre o con fitorreguladores si no se tiene experiencia en cuanto a la respuesta a obtener. Así mismo no es recomendable la mezcla con más de dos productos distintos, aunque sean compatibles. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

#### **ALMACENAMIENTO**

Conservar el producto en su envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre  $4^{\circ}\text{C}$  y  $40^{\circ}\text{C}$ .

#### **ADVERTENCIA**

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

| CULTIVO                                              | EFFECTOS                                                                                                                                    | ÉPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                  | DOSIS Y MODO DE EMPLEO                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÍTRICOS</b>                                      | Estimula la brotación e inducción floral.<br>Acelera el desarrollo de los brotes.<br>Mejora el cuajado, desarrollo y calibre de los frutos. | Comenzar las aplicaciones al inicio de la brotación y continuar las aplicaciones durante todo el proceso vegetativo. | Plantones: 5 cc/árbol y mes repartidos en varios riegos.<br>Árboles jóvenes: 10 - 15 cc/árbol y mes repartidos en varios riegos<br>Árboles adultos: 15 - 20 cc/árbol y mes repartidos en varios riegos, hacer coincidir la aplicación con las tres brotaciones principales. |
| <b>FRUTALES DE HUESO</b> (Incluido el albaricoquero) | Proporciona una brotación más regular.<br>Viste mejor el árbol.                                                                             | Al inicio de la brotación junto con el quelato de hierro FERRALE®EVO.                                                | En árboles en producción, aplicar 40 cc/pie repartidos en varios riegos durante el primer mes, repetir las aplicaciones en caso de pretender estimular o alargar los brotes.                                                                                                |
|                                                      | Aumenta el calibre.<br>Mejora la coloración.                                                                                                | Al inicio del cambio de color.                                                                                       | Aplicar 40 cc/pie desde el cambio de color al fin de la recolección, es conveniente aplicar junto con LIQUI-K.                                                                                                                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | En albaricoque aumentar las dosis según el porte del árbol.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FRUTALES DE PEPITA</b>                            | Estimula la brotación.                                                                                                                      | Desde yema hinchada hasta plena floración.                                                                           | 120 cc/árbol. Repartidos en varios riegos durante los periodos señalados.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Aumenta el calibre.                                                                                                                         | Desde el fruto cuajado hasta la maduración.                                                                          | 60 cc/árbol. Repartidos en varios riegos durante los periodos señalados.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UVA DE MESA</b>                                   | Estimula la brotación.                                                                                                                      | Aplicar al inicio de la brotación.                                                                                   | Aplicar un mínimo de 20 cc/parra o cepa junto con el quelato de hierro FERRALE® EVO durante el primer mes del ciclo vegetativo.                                                                                                                                             |
|                                                      | Mejora el desarrollo del racimo asegurando el aporte de nutrientes.                                                                         | Después del cuajado.                                                                                                 | Aplicar 25 cc/parra o cepa junto con el quelato de hierro FERRALE® EVO.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OLIVO</b>                                         | Alarga las brotaciones.                                                                                                                     | Plantones: Durante todo el periodo vegetativo.                                                                       | Repartir 30 – 40 cc/árbol durante todo el periodo vegetativo.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | Favorece la metida (alarga y fortalece las brotaciones).<br>Mejora el cuajado.<br>Evita la caída de frutos jóvenes.                         | 1- Al inicio de la brotación.<br>2- Al inicio de la floración.<br>3- Frutos del tamaño de un guisante.               | Aplicar, en cada uno de los momentos indicados, la siguiente dosis repartida en el riego:<br>Árboles jóvenes: 30 - 40 cc/árbol.<br>Árboles adultos: 40 - 60 cc/árbol.                                                                                                       |
| <b>TOMATE Y PIMIENTO</b>                             | Mejora el arraigo y favorece la vegetación.                                                                                                 | Desde el trasplante hasta la floración del primer ramillete.                                                         | Repartir de 10 a 20 l/ha en 3 - 5 riegos.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Mejora el cuajado.                                                                                                                          | Desde el cuajado del primer ramillete y siguientes.                                                                  | Aplicar, para cada ramillete, de 10 a 20 l/ha repartidos en dos riegos.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TOMATE DE INDUSTRIA</b>                           | Estimula la vegetación, cuajado y calibre.                                                                                                  | 1- Crecimiento vegetativo.<br>2- Inicio de la floración.<br>3- Crecimiento del fruto.                                | Aplicar un total de 5-10 l/ha divididos en 2-3 riegos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CUCURBITÁCEAS</b>                                 | Mejora la vegetación.                                                                                                                       | En estado de 3 - 4 hojas.                                                                                            | Aplicar 3 l/ha repartidos en varios riegos a partir del momento indicado.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Mejora la floración, cuajado y desarrollo de los frutos.                                                                                    | Comienzo de la floración, cuajado y engorde.                                                                         | Aplicar 10 - 15 l/ha repartidos en varios riegos.                                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRESÓN</b>                    | Favorece la vegetación.<br>Mejora el cuajado.                                                    | Durante todo el periodo vegetativo.                                                               | Realizar varias aplicaciones a 5 l/ha cada una de ellas.                                                      |
| <b>LECHUGA, APIO Y BRASSICAS</b> | Favorece el arraigue.<br>Estimula la vegetación.                                                 | Durante todo el ciclo de cultivo.                                                                 | Aportar 5 l/ha cada semana.                                                                                   |
| <b>ALCACHOFA</b>                 | Acelera el crecimiento vegetativo.                                                               | Durante todo el periodo vegetativo.                                                               | Aportar 10 - 15 l/ha por aplicación en 3 a 4 riegos.                                                          |
| <b>CEBOLLA, PUERRO, AJO</b>      | Mejora la vegetación.<br>Favorece la formación del bulbo.                                        | A los 8 - 10 cm de altura.<br>2 aplicaciones más a 20 días de intervalo.                          | Aplicar 5 l/ha por riego.                                                                                     |
| <b>PATATA</b>                    | Aumenta la producción.<br>Regula los calibres.                                                   | Comenzar la aplicación a los 30 días de la emergencia.                                            | Aplicar 2 - 3 veces desde el momento indicado al final del periodo vegetativo a 10-15 l/ha por riego.         |
| <b>ALGODÓN</b>                   | Estimula el desarrollo.<br>Favorece el cuajado.                                                  | En el caso de bajas temperaturas.                                                                 | Aplicar a 10 l/ha.                                                                                            |
|                                  |                                                                                                  | Al inicio de la floración y repetir 2-3 veces con 15 días de intervalo.                           | Aplicar de 5 a 10 l/ha en cada riego.                                                                         |
| <b>TABACO</b>                    | Estimula la vegetación.                                                                          | Primer riego de trasplante.                                                                       | Aplicar 0,5 cc/planta.                                                                                        |
|                                  | Facilita la formación de la hoja.                                                                | Cada 15 días a lo largo de todo el ciclo, con un mínimo de 4 aportaciones.                        | Aplicar 0,2 cc/planta y riego.                                                                                |
| <b>LEGUMBRES FORRAJERAS</b>      | Estimula la vegetación. Facilita el cuajado. Mejora el contenido de proteínas.                   | Formación de la 3ª hoja foliada: tres aplicaciones con 20 días de intervalo.                      | Aplicar 5 – 10 l/ha.                                                                                          |
| <b>JUDÍA VERDE Y GUISANTE</b>    | Favorece la vegetación. Incrementa el cuajado. Facilita la formación de vainas y granos.         | A la aparición de los primeros botones florales y cada 20 días (con un mínimo de 3 aplicaciones). | Aplicar, en cada riego, 2 l/ha.                                                                               |
| <b>PLATANERA</b>                 | Favorece el desarrollo vegetativo y la formación de hijos.<br>Estimula el crecimiento del fruto. | A lo largo de todo el ciclo de cultivo.                                                           | Aportar un total de 50 cc/planta y ciclo, fraccionando esta dosis en aplicaciones semanales de 4-5 cc/planta. |