

RECORD®
MEZCLA LÍQUIDA DE CALCIO Y MAGNESIO
CON BORO (B), MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn)
Para aplicación foliar y fertirrigación
ABONO HIDROSOLUBLE
Suspensión Concentrada (SC)

CONTENIDO DECLARADO:

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	7,0% p/p	
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	1,7% p/p	
Boro (B) soluble en agua		0,1% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	1,5% p/p	
Zinc (Zn) soluble en agua	0,5% p/p	

pH (1% p/v): 4

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca registrada por Sipcam Inagra, S.A.

Masa Neta: kg
Contenido: litros
Lote: Ver envase

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO



- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- P330 Enjuagarse la boca.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica

Ácido nítrico, sal de amonio y calcio (CAS: 15245-12-2); Sulfato de manganeso H₂O (CAS: 10034-96-5); Sulfato de cinc (hidrato) (mono-) (CAS: 7733-02-0)

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Tel.: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: FX7K-PW05-WK51-RH6E

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



CARACTERÍSTICAS

RECORD® es una especialidad nutricional con una formulación exclusiva activadora de los procesos metabólicos que intervienen en la absorción de calcio en la planta y participa activamente en la construcción de los tejidos de la planta, ayudando al transporte de calcio desde los órganos de acumulación.

RECORD® está como suspensión concentrada, perfectamente miscible en agua y totalmente asimilable, tanto por vía radicular como por vía foliar por la planta.

RECORD® se complementa con microelementos esenciales que mejoran la absorción y translocación de nutrientes, especialmente del calcio en la planta. Al mismo tiempo, los componentes presentes en su formulación favorecen el desarrollo vegetativo óptimo en todos los cultivos, destacando sus efectos en las últimas fases del ciclo del cultivo.

Al aplicar **RECORD®** en la planta, se puede apreciar una mayor firmeza y consistencia del fruto, uniformidad de coloración, mayor contenido en azúcares, mayor turgencia de los tejidos en cultivos de hoja y mayor vida útil postcosecha. En definitiva, favorecerá los procesos de engorde, maduración y coloración del fruto y una mejor calidad en los cultivos de hoja.

DOSIFICACIÓN, MODO Y ÉPOCA DE EMPLEO

Su empleo está indicado en cítricos, frutales, remolacha y hortalizas, entre otros cultivos de interés.

Cítricos: Desde inicio de floración hasta cambio de color del fruto en intervalos de 15- 20 días a dosis de 0,2 - 0,3% (200 - 300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Frutales de hueso, pepita y cáscara: Desde inicio de floración hasta cambio de color del fruto en intervalos de 15- 20 días a dosis de 0,2 – 0,3% (200 - 300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Fresa: Aplicar desde la aparición de las primeras flores hasta fin de ciclo en intervalos de 15- 20 días a dosis de 0,2 – 0,3% (200 - 300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Hortícolas de fruto: Aplicar desde la aparición de las primeras flores hasta fin de ciclo en intervalos de 15- 20 días a dosis de 0,2 – 0,3% (200 - 300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Cultivos de hoja y flor formadores de pella o cogollo: Se debe aplicar desde el inicio del apellado o acogollado, a dosis de 0,2 – 0,3% (200-300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3 l/ha en fertirrigación.

Otro tipo de hortalizas: aplicar durante el desarrollo vegetativo a dosis de 0,2 - 0,3% (200-300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Vid (uva de mesa y de vinificación): Aplicar desde la aparición de los primeros capuchones florales, separados del receptáculo hasta bayas listas para recolectarse a dosis de 0,2 – 0,3% (200 - 300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Olivo: Desde inicio de floración, cuajado y endurecimiento de hueso a 0,2 – 0,3% (200 - 300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

Remolacha: se debe aplicar durante la etapa de crecimiento activo a dosis de 0,15 – 0,25% (150 - 250 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 2,5 l/ha en fertirrigación.

Higuera: Aplicar desde inicio de floración hasta final de ciclo en intervalos de 20 días a dosis de 0,2 – 0,3% (200-300 cc/hl) mediante pulverización foliar, o a dosis de 3-5 l/ha en fertirrigación.

PRECAUCIONES

El producto permanece estable en condiciones normales de humedad, temperatura y aireación en su envase original cerrado, durante al menos 2 años. No almacenar por debajo de 0°C ni por encima de 40°C.

No aplicar con temperaturas altas ($\geq 30^{\circ}\text{C}$). Se puede mezclar con otros fertilizantes y fitosanitarios. No mezclar con aceites ni con azufre. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.