

SIPFOL® MAX +
Última revisión: 31.01.2025

SIPFOL® MAX +
AMINOÁCIDOS CON MICRONUTRIENTES
Abono hidrosoluble
Concentrado Soluble (SL)

CONTENIDO DECLARADO :

Aminoácidos libres	12,0% p/p
Nitrógeno (N) total	7,3% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	6,7% p/p
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	2,5% p/p
Boro (B) soluble en agua	0,04% p/p
Cobre (Cu) total	0,01% p/p
Cobre (Cu) soluble en agua	0,008% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua	0,12% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,12% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	0,05% p/p

Aminograma:

Alanina, Arginina, Ácido aspártico, Ácido glutámico, Glicina (30% p/p), Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina.

pH sol 10% w/w: 6.0±1.0

Aminoácidos obtenidos por hidrólisis de proteína de origen animal.

Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca de Sofbey Sarl



Apto para su uso en agricultura ecológica, según “Standard Bioagricert Inputs”.
Controlado por Bioagricert.

Masa Neta: kg
Contenido: litros
Lote: Ver envase

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta
UFI: XY98-PHW0-YJ0J-YR2E

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



CARACTERÍSTICAS

SIPFOL® MAX +, por su contenido en **aminoácidos** y nitrógeno orgánico, proporciona a las plantas un medio nutritivo y estimulante de acción inmediata, independientemente de su función clorofílica, ya que pasa rápidamente a la savia elaborada y es utilizado directamente por los vegetales para su desarrollo.

SIPFOL® MAX + estimula la inducción floral, favorece el cuajado, incrementa los calibres, mejora la consistencia de la piel y anticipa la maduración de los frutos.

SIPFOL® MAX +, por su contenido en **magnesio**, mejora la actividad fotosintética, facilita la absorción y transporte del fósforo en el momento de la floración, contribuye a aumentar la resistencia de las plantas a las condiciones desfavorables: sequía, heladas, pedriscos, fitotoxidades, etc., y evita las carencias graves de este elemento.

SIPFOL® MAX +, por su contenido en **microelementos**, es un medio de mantener el equilibrio necesario de éstos en las plantas.

SIPFOL® MAX +, por su **pH**, posee un efecto penetrante y tamponizador, así como mejorante de los caldos o aguas de pulverización.

SIPFOL® MAX +, por su poder adherente, no necesita ser aplicado con mojante.

PRECAUCIONES

No mezclarlo con aceites insecticidas y sales de cobre sin haber comprobado el efecto fitotóxico de la mezcla sobre el cultivo y estado concreto, ni sobrepasar las dosis, en invernaderos y en mezclas con azufre, de 300 cc por cada 100 litros de agua en cultivos sensibles.

No emplear en ciruelos ni en cultivos ornamentales para flor cortada en los que no se hayan hecho pruebas previamente.

Producto no destinado a su aplicación en tierras a las que los animales de granja tengan acceso.

APLICACIONES

SIPFOL® MAX + está aconsejado para emplear en: FRUTALES, OLIVO, CÍTRICOS, PLATANERA, VID, CULTIVOS HORTÍCOLAS EN GENERAL Y EN PARTICULAR LOS APROVECHABLES POR SUS HOJAS, CULTIVOS INDUSTRIALES (algodón, girasol, remolacha, etc.), LEGUMINOSAS DE GRANO (habas, guisantes, judías, etc.), CEREALES (maíz, trigo, arroz, etc.), CULTIVOS ORNAMENTALES y FLORALES, VIVEROS Y PLANTACIONES JÓVENES, CULTIVOS EN INVERNADEROS, etc., así como en todos aquellos cultivos que estén dañados por alguna causa externa: heladas, granizos, sequía, encharcamientos, tratamientos fitosanitarios, etc.

DOSIFICACION

Aplicar vía foliar de 150 a 300 cc por 100 litros de agua (0,15 - 0,3%) en pulverización normal, y de 1 a 3 l/ha en pulverización a bajo volumen.

Aplicar vía radicular de 2 a 4 litros por hectárea. En platanera, aplicar vía radicular a dosis de 1,5 – 2 cc/planta y semana

El número de aplicaciones a lo largo de todo el ciclo vegetativo es de 2 a 4 dependiendo del cultivo. Aconsejamos consultar con alguno de nuestros técnicos para un óptimo uso del producto.

MODO Y ÉPOCA DE EMPLEO

SIPFOL® MAX + debe ser empleado en los primeros estados de desarrollo de las plantas para estimular su crecimiento rápidamente (viveros, plantaciones jóvenes, semilleros, momentos de trasplantes, etc.), en los momentos precedentes y posteriores a la floración, cuajado y engorde de los frutos, en el caso de recuperación de cultivos enfermos, circunstancias adversas (frío, granizo, sequía, fitotoxicidades, etc.), así como en cualquier momento del cultivo, en especial en el momento de la última fase vegetativa de los frutos.

ALMACENAMIENTO

El producto permanece estable en condiciones normales de humedad, temperatura y aireación en su envase original cerrado, durante al menos 2 años. No almacenar por debajo de 4°C ni por encima de 30°C.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.