

STILO® VERDE
AMINOÁCIDOS CON MICRONUTRIENTES
Concentrado Soluble (SL)

CONTENIDO DECLARADO:

Aminoácidos libres	10,00% p/p
Nitrógeno (N) total	7,5% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	2,7% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	4,8% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,10% p/p
Manganeso (Mn) quelado por EDTA	0,06% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	0,10% p/p
Zinc (Zn) quelado por EDTA	0,10% p/p

Aminograma:

Ácido aspártico, Ácido glutámico (50% p/p), Alanina, Glicina, Prolina, Serina, Valina.

pH (100%): 6,0

Aminoácidos obtenidos por fermentación de carbohidratos mediante *Corynebacterium*.

Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca registrada por Sofbey Sarl

Masa Neta: kg

Contenido: litros

Lote: Ver envase

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO



- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P261 Evitar respirar los vapores.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

ATENCIÓN

- P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280 Llevas guantes/prendas/ máscara de protección.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene, 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, n° CAS 2634-33-5; 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS: 26530-20-1)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta
UFI: P8NT-H9NT-TK53-7IWU

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales y, evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**CARACTERÍSTICAS**

STILO® VERDE es una especialidad nutricional concebida para la aplicación foliar en cultivos extensivos como cereales, maíz, arroz, olivar, patata y otros (ver tabla). Su formulación equilibrada y especialmente diseñada para ayudar a la planta a recuperarse de situaciones diversas de estrés abiótico, beneficia a los cultivos tratados otorgándoles una mayor resistencia frente a diversos fenómenos; destacando entre otros, condiciones de sequías, golpes de calor, salinidad, aplicaciones herbicidas, etc., lo cual se traduce en un mejor crecimiento vegetativo y finalmente en un mejor rendimiento productivo y en mejores parámetros de calidad de la cosecha.

Los aminoácidos de **STILO® VERDE** proceden de la fermentación de carbohidratos mediante *Corynebacterium*, lo que asegura un máximo contenido en isómeros L, únicos aminoácidos biológicamente activos. Gracias al elevado contenido en aminoácidos libres y su rápida incorporación a la savia elaborada de las plantas, proporciona un medio nutritivo y estimulante de inmediato aprovechamiento por parte de los cultivos.

STILO® VERDE, incorpora en su formulación azufre y Zn y Mn quelados por EDTA, que ayudan a prevenir los estados carenciales de estos nutrientes en la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	EFFECTOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS Y MODO DE EMPLEO
ALGODÓN	Estimula el desarrollo vegetativo Favorece el cuajado	En el caso de bajas temperaturas y momentos de estrés También es posible aplicarlo al inicio de la floración y repetir 2-3 veces con 15 días de intervalo	Aplicar de 2 a 3 l/ha en pulverización foliar
TABACO	Estimula la vegetación Facilita la formación de la hoja	A partir del trasplante, coincidiendo con momentos de estrés	
LEGUMBRES FORRAJERAS	Estimula la vegetación Facilita el cuajado Mejora el contenido de proteínas	A partir de la formación de la 3ª hoja en momentos de estrés	
MAÍZ	Estimula la vegetación y favorece la asimilación de nutrientes	A partir de la formación de la 4ª hoja en momentos de estrés	
CEREALES	Favorece el ahijado, aumenta la producción y el peso específico Mejora el contenido de proteínas	En mezcla con herbicidas o fungicidas en las aplicaciones realizadas en post-emergencia, para paliar el estrés provocado en el cultivo	
ARROZ	Favorece el ahijado, aumenta la producción y el peso específico	En mezcla con herbicidas o fungicidas en las aplicaciones realizadas en post-emergencia, para paliar el estrés provocado en el cultivo	
ALFALFA	Favorece el desarrollo vegetativo Adelanta y aumenta la producción	Fases iniciales del ciclo de cultivo, en momentos de estrés	
REMOLACHA	Estimulación de la vegetación Favorece tanto el desarrollo foliar como radicular	A partir de 2-4 hojas, en momentos de estrés aprovechando las aplicaciones de fitosanitarios	
FRUTALES DE CÁSCARA (almendro, pistacho, avellano, nogal)	Aumenta la brotación y mejora la floración y el cuajado	Aplicar en los tratamientos de primavera	
COLZA	Estimulación de la vegetación Favorece tanto el desarrollo foliar como radicular	A partir de 2-4 hojas, en momentos de estrés aprovechando las aplicaciones de fitosanitarios	

PRECAUCIONES

Evitar aplicar el producto en caldos de pH superior a 10. No aplicar con altas temperaturas ($\geq 30^{\circ}\text{C}$). Se puede mezclar con la mayoría de abonos foliares y fitosanitarios. No mezclar con aceites, azufre o fitorreguladores si no se tiene experiencia en cuanto a la respuesta a obtener. Así mismo no es recomendable la mezcla con más de dos productos distintos, aunque sean compatibles. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre 4°C y 40°C .

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.