TONOFOL® Mg
MEZCLA SÓLIDA DE CALCIO (Ca) Y MAGNESIO (Mg) CON MICRONUTRIENTES

Para aplicación foliar

CONTENIDO DECLARADO:

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	2,0%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	8,6%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,5%
Cobre (Cu) quelado por EDTA	0,25%
Manganeso (Mn) soluble en agua	11%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,1%
Zinc (Zn) total	19%

Cobre quelado por EDTA. Intervalo de estabilidad de la fracción quelada entre 1<pH<11

pH: 7,5

Distribuidor:
SIPCAM IBERIA, S.L.
Prof. Beltrán Báguena, 5
46009 VALENCIA
Tel.: 963 483 500
sipcamiberia.es

Fabricante:
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5
46009 VALENCIA

® Marca de Sofbey Sarl

Masa Neta: **kg**
Lote: *Ver envase*

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

PELIGRO

- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P260 No respirar el polvo.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene sulfato de manganeso (H2O) (CAS: 10034-96-5)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

UFI: D46H-S6EP-MM5V-KA2U

GESTIÓN DE ENVASES:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

CARACTERÍSTICAS

TONOFOL® Mg es un corrector simultáneo de las carencias de magnesio, zinc y manganeso, que incorpora en su formulación un alto contenido en cobre y molibdeno, aplicable por vía foliar en TODA CLASE DE CULTIVOS, especialmente en cítricos.

Tanto el magnesio, como el zinc y el manganeso son elementos fundamentales para la vida del vegetal. El magnesio es un constituyente de excepción de la clorofila y el zinc es un componente fundamental en el proceso de la fotosíntesis y en la síntesis del ácido indolacético, una de las principales hormonas de crecimiento de las plantas.

Dado su alto contenido en estos nutrientes, se comporta como un corrector muy eficaz que corrige o previene eficazmente los estados carenciales de estos elementos.
Está aconsejado en los cultivos que vegetan en suelos mal drenados, alcalinos o ácidos.

TONOFOL® Mg proporciona excelentes resultados en todo tipo de frutales y hortícolas.

APLICACIONES

Recomendado en TODO TIPO DE CULTIVOS y en especial en CÍTRICOS.

DOSIFICACIÓN

TONOFOL® Mg debe ser empleado a 0,2 – 0,3% (200 – 300 gramos por 100 litros de agua) en pulverización normal. En aplicaciones a bajo volumen, respetar la dosis de 3 - 4 kg/ha.

MODO DE EMPLEO

TONOFOL® Mg puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos contra plagas o enfermedades que se quieran combatir, previa comprobación de la compatibilidad de las mezclas.

Realícese una buena homogeneización del producto. **TONOFOL® Mg** puede ser aplicado en cualquier época del año. En cítricos debe realizarse en primavera o verano coincidiendo con las brotaciones de esta época.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.