

TYRIS
AMINOÁCIDOS
Suspensión Concentrada (SC)

CONTENIDO DECLARADO:

Aminoácidos libres	6,0% p/p
Nitrógeno (N) total	1,3% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	1,2% p/p

Aminograma: Ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, fenilalanina, glicina, hydroxiprolina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, valina.

Aminoácidos obtenidos de hidrolizado vegetal

Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

pH- 4 ± 1

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Masa Neta: kg

Contenido: litros

Lote: Ver envase

**ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO**

**ATENCIÓN**

- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas de protección.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (CAS: 2634-33-5)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIÁTAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

UFI: GDCV-XCX9-TM5V-V0NT

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**CARACTERÍSTICAS**

TYRIS® es una especialidad nutricional con un marcado efecto como potenciador del sistema radicular de la planta, mejorando la eficiencia de sus procesos celulares y favoreciendo la aparición de raíces secundarias y pelos absorbentes. Esto permite aumentar la absorción y traslocación de nutrientes, mejorar el desarrollo foliar y aumentar la actividad fotosintética.

La aplicación de **TYRIS®** favorece que las plantas completen sus procesos fisiológicos en momentos de máxima necesidad y gracias a su formulación altamente biodisponible se traduce en beneficios como:

- Potenciar la aparición de raíces secundarias y pelos radiculares.
- Favorecer un sistema radicular fuerte con mayor superficie de absorción.
- Favorecer la fertilidad biológica del suelo y de la planta.
- Fortalecer el crecimiento de las plantas desde las primeras fases de su desarrollo.
- Plantaciones jóvenes con brotaciones homogéneas
- Floración más equilibrada y una mejora en el rendimiento y la calidad de la producción.

APLICACIONES

Gracias a que es un producto altamente asimilable con una muy buena traslocación en el interior de la planta, se recomienda aplicaciones tanto por vía foliar como vía radicular, obteniéndose unos óptimos resultados en todo tipo de cultivos. En ciruelo no aplicar vía foliar.

Cultivos	Aplicación	Dosis
HORTÍCOLAS DE FRUTO (tomate, berenjena, pimiento, judía, melón, sandía, pepino, calabacín, etc.)	A partir de los 7-14 días del trasplante. Se recomienda 2-3 aplicaciones con intervalos de 15 días.	1,5-2 l/ha (vía foliar) 3-4 l/ha (vía riego)
HORTÍCOLAS DE RAÍZ, BULBO y TUBÉRCULO (zanahoria, cebolla, patata, etc.)	Inicio de la formación de los órganos subterráneos	1-2 l/ha (vía foliar) 2 l/ha (vía riego)
HORTÍCOLAS DE HOJA y DE FLOR (coles, coliflores, lechugas, apio, brócoli, espinaca, escarola, alcachofa, etc.)	Aplicar 7-14 días después del trasplante. Se recomienda 2-3 aplicaciones con intervalos de 15 días.	1,5-2 l/ha (vía foliar) 3-4 l/ha (vía riego)
ARBÓREOS (cítricos, frutales, uva de mesa, vid, olivo, higuera, etc.)	Desde inicio de brotación. Se recomienda 2-3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 15 días.	1-3 l/ha (vía foliar) 4-5 l/ha (vía riego)
CULTIVOS EXTENSIVOS (maíz, maíz dulce, girasol, etc.)	A partir de la aparición de la 4ª hoja (BBCH 14) vía foliar. Se recomienda 1 aplicación.	1 l/ha (vía foliar)

PRECAUCIONES

Debido a su pH y composición **TYRIS®** puede mezclarse con la mayoría de los abonos y fitosanitarios. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y 40°C.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.